

Acesan 30 mg 63 tabl.

Cena: 17,97 PLN



Opis słownikowy

Dawka	30 mg
Opakowanie	63 tabl.
Postać	tabl.
Producent	SUN-FARM SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Acidum acetylsalicylicum

Opis produktu

ACESAN 30 mg

jest lekiem wskazanym do stosowania celem zapobiegania zawałowi mięśnia sercowego u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka; zapobiegania powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po interwencjach na naczyniach (pomostowanie aortalno-wieńcowe – ang. CABG), w profilaktyce udaru mózgu, w dławicy piersiowej oraz celem zapobiegania powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po świeżym zawał mięśnia sercowego.

Właściwości:

Substancją czynną leku ACESAN jest kwas acetylosalicylowy, który hamuje zdolność płytek krwi do agregacji (zlepiania) i tworzenia zakrzepów. Kwas acetylosalicylowy jest substancją z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Mechanizm jego działania polega na hamowaniu aktywności enzymu cyklooksygenazy (COX), niezbędnego do syntezy tromboksanu A₂ (TXA₂) – głównego czynnika powodującego zlepianie się płytek krwi.

Skład:

Substancja czynna: kwas acetylosalicylowy.
Jedna tabletkę zawiera 30 mg kwasu acetylosalicylowego.
Substancje pomocnicze to: celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), kwas stearynowy, żółcień chinolinowa, lak (E104)

Stosowanie:

Lek Acesan należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

O doborze dawki leku ACESAN decyduje lekarz na podstawie wywiadu.

Zwykle stosuje się 1 tabletkę raz na dobę.

Tabletki należy przyjmować doustnie, najlepiej w trakcie posiłku, z dużą ilością płynu.

Ważne informacje:

Leku ACESAN nie należy stosować:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną – kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,

- u pacjentów ze skazą krwotoczną,- u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy,

- u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby,- u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek,

- u pacjentów z ciężką niewydolnością serca,- u pacjentów, u których występowały w przeszłości napady astmy oskrzelowej, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych,- jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych,

- w ostatnim trymestrze ciąży,

- u dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych, szczególnie takich jak grypa lub ospa wietrzna, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a – rzadkiej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu.

Lek Acesan należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią i w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.