

Acetylcysteinum Flegamina 600mg 10tab.mus.

Cena: 11,49 PLN



Opis słownikowy

Dawka	0,6 g
Opakowanie	10 tabl.
Postać	tabl.mus.
Producent	TEVA B.V.
Rejestracja	
Substancja czynna	Acetylcysteinum

Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: lek
PRODUCENT: TEVA B.V.
ILOŚĆ: 10 tabletek musujących

Acetylcysteinum Flegamina

DZIAŁANIE:

Acetylcysteinum Flegaminazawiera substancję czynną acetylocysteinę, która jest lekiem rozrzedzającym uporczywy śluz w drogach oddechowych.

WSKAZANIA:

Acetylcysteinum Flegaminajest wskazana u młodzieży w wieku powyżej 14 lat i dorosłych do rozrzedzania śluzu i ułatwiania jego odkrztuszenia w zapaleniu oskrzeli wywołanym przeziębieniem z towarzyszącą uporczywą wydzieliną dróg oddechowych i zmniejszonym transportem śluzu.

DAWKOWANIE:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki. Należy postępować zgodnie z poniższymi informacjami, chyba że lekarz zalecił inny schemat dawkowania. Należy przestrzegać instrukcji stosowania, w przeciwnym razie Acetylcysteinum Flegamina nie będzie działać prawidłowo. Zalecane dawkowanie: Młodzież w wieku od 14 lat i dorośli-1 tabletka musująca raz na dobę. Sposób i czas stosowania Tabletkę musującą należy rozpuścić w szklance wody, a następnie wypić zawartość całej szklanki. Lek można przyjmować niezależnie od posiłku. Nie stosować dłużej niż 5 dni.

SKŁAD:

Substancją czynną leku jest: acetylocysteina.

1 tabletkę musującą zawiera 600mg acetylocysteiny.

Pozostałe składniki leku to: kwas cytrynowy bezwodny, sodu wodorowęglan, kwas dypinowy, powidon K-25, aspartam (E951), aromat cytrynowy (zawiera maltodekstrynę, sacharozę, gumę arabską (E414), triacetynę (E1518), alfa-tokoferol (E307)).

OSTRZEŻENIA:

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty. Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4. Jeśli po upływie 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.