

Aescin 20 mg, 30 tabletek



Cena: 21,47 PLN

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|---|
| Dawka | 0,02 g |
| Opakowanie | 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) |
| Postać | tabl.powl. |
| Producent | TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O. |
| Rejestracja | |
| Substancja czynna | Escinum |

Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: LEK

PRODUCENT: TEVA PHATMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.O.

ILOŚĆ: 30 tabletek

Aescin działa przeciwobrzękowo i przeciwzapalnie oraz poprawia stan napięcia naczyń krwionośnych. Zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych. Wykazuje skuteczność w leczeniu obrzęków pooperacyjnych oraz pourazowych. Lek powoduje szybsze wchłanianie krwiaków pourazowych oraz zmniejsza prawdopodobieństwo ich wystąpienia w okresie pooperacyjnym (szczególnie po zabiegach chirurgicznych narządu ruchu). Ponadto, uszczelniając śródbłonek naczyń krwionośnych poprawia krążenie żylnolimfatyczne. Produkt stosowany jest również w zapobieganiu zakrzepowemu zapaleniu żył w okresie pooperacyjnym, także w leczeniu zaburzeń krążenia żylnego kończyn i żyłaków kończyn dolnych.

WSKAZANIA:

Wskazaniem do stosowania leku Aescin jest leczenie przewlekłej niewydolności żylnnej, żylaków kończyn dolnych, żylaków odbytu, leczenie zapalenia żył kończyn dolnych, profilaktyka i leczenie krwawiaków i obrzęków pooperacyjnych i pourazowych.

DAWKOWANIE:

Dorośli: 2 tabletki, do 3 razy na dobę.

SKŁAD:

1 tabletkę zawiera 20 mg alfa-escyny.

OSTRZEŻENIA:

Leku nie należy stosować jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek oraz u kobiet w czasie ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.