


Apap Intense 0,2g+0,5g 10 tabl.

Cena: 15,76 PLN



Opis słownikowy

Dawka	0,2g+0,5g
Opakowanie	10 tabl.
Postać	tabl.powl.
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Ibuprofenum, Paracetamolum

Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: lek
PRODUCENT: US PHARMACIA SP. Z O.O.
ILOŚĆ: 10 tabletek

Apap Intense 10 tabletek powlekanych

DZIAŁANIE:

Łagodzeniu bólu, zmniejszaniu obrzęku i obniżaniu wysokiej temperatury ciała..

WSKAZANIA:

Paracetamol jest lekiem przeciwbólowym, który działając inaczej niż ibuprofen, łagodzi ból i gorączkę. Lek ten jest szczególnie odpowiedni do uzyskania silniejszego działania przeciwbólowego niż w przypadku zastosowania samego ibuprofenu lub samego paracetamolu.

DAWKOWANIE:

Dorośli: zalecana dawka to 1 tabletkę, przyjmowana podczas posiłku i popijana wodą, nie częściej niż 3 razy na dobę.

Należy zachować co najmniej 6 godzinną przerwę pomiędzy dawkami.

Jeśli po przyjęciu jednej tabletki objawy nie ustępują, można przyjąć maksymalnie dwie tabletki, nie częściej niż trzy razy na dobę.

Nie przyjmować więcej niż sześć tabletek w ciągu 24 godzin (co odpowiada 1200 mg ibuprofenu i 3000 mg paracetamolu na dobę).

SKŁAD:

Substancje czynne leku to ibuprofen i paracetamol. Jedna tabletkowa powlekana zawiera 200 mg ibuprofenu i 500 mg paracetamolu.

Pozostałe składniki:

Rdzeń tabletki: skrobia kukurydziana, krospowidon (Typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, powidon K-30, skrobia, żelowana kukurydziana, talk, kwas stearynowy.

Otoczka: alkohol poliwinylowy, talk, makrogol 3350, tytanu dwutlenek (E171).

OSTRZEŻENIA:

Lek należy przyjmować wyłącznie przed snem

Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia

W trakcie stosowania leku nie należy spożywać alkoholu

Nie należy łączyć z innymi lekami zawierającymi paracetamol

W czasie stosowania leku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych

Przed rozpoczęciem stosowania leku APAP Noc należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą

-stosowanie leku przez osoby z niewydolnością wątroby, nadużywające alkoholu oraz głodzone niesie ryzyko uszkodzenia wątroby;

-ostrożnie stosować u osób z niewydolnością nerek, zaburzeniami rytmu serca, nadciśnieniem tętniczym, padaczką, myastheniagravis, nadczynnością gruczołu tarczowego, zwężeniem odźwiernika oraz u osób w podeszłym wieku;

-w czasie przyjmowania leku nie wolno pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby;

-lek należy przyjmować wyłącznie przed snem.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.