


Apap Przeziębienie Junior 6 sasz.



Cena: 26,69 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,3g+0,02g+5mg
Opakowanie	6 sasz.
Postać	pr.do p.roztw.
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Paracetamol, Acidum ascorbicum, Phenylephrini hydrochloridum

Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: lek
PRODUCENT: US PHARMACIA SP. Z O.O.
ILOŚĆ: 6 saszetek

APAP PRZEZIĘBIENIE JUNIOR 6 saszetek

DZIAŁANIE:

Paracetamol działa przeciwgorączkowo i przeciwbólowo, fenylefryna zmniejsza obrzęk i przekrwienia błony śluzowej i na przeziębienie jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku od 6 lat.

WSKAZANIA:

Lek wskazany jest do krótkotrwałego stosowania w leczeniu objawów przeziębienia i grypy, takich jak: gorączka i dreszcze, ból głowy, bóle mięśniowo-stawowe, ból gardła, niedrożność przewodów nosowych i zatok przebiegająca z bólem, nieżyt błony śluzowej nosa (katar).

DAWKOWANIE:

Masa ciała (wiek) Liczba saszetek Maksymalna dawka dobową
17-25kg (4-8 lat) 1saszetka 1000 mg paracetamolu (4 saszetki)
26-40kg (8-12 lat) 2saszetki 1500 mg paracetamolu (6 saszetek)

SKŁAD:

Substancjami czynnymi leku są: paracetamol, kwas askorbowy, fenylefryny chlorowodorek.

1 saszetka zawiera 300 mg paracetamolu, 20 mg kwasu askorbowego i 5 mg fenylefryny chlorowodoru.

Pozostałe składniki Pozostałe składniki leku to: mannitol (E421), kwas cytrynowy, sodu cytrynian, sodu cyklaminian, sacharyna sodowa, wapnia glukonian, aromat pomarańczowy*, aromat truskawkowy, krzemionka koloidalna bezwodna. aromat pomarańczowy* (olejek pomarańczowy, olejek cytrynowy, alkohol C-12, linalol, alkohol benzylový, cytronelal, dekstroza, guma arabska, syrop glukozowy z odwodnionej kukurydzy, butylohydroksyanizol). aromat truskawkowy (cis-3-heksenol, furaneol, etylo-2-metylomaślan, kwas heksanowy, metylu cynamonian, maltol, guma arabska, syrop glukozowy z odwodnionej kukurydzy, krzemu dwutlenek).

OSTRZEŻENIA:

Należy zachować co najmniej 6-godzinny odstęp pomiędzy dwiema dawkami
Stosować u dzieci powyżej 17 kg
Nie należy łączyć z innymi lekami zawierającymi paracetamol
Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni, należy skontaktować się z lekarzem

Przed rozpoczęciem stosowania leku APAP Noc należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą
-stosowanie leku przez osoby z niewydolnością wątroby, nadużywające alkoholu oraz głodzone niesie ryzyko uszkodzenia wątroby;
-ostrożnie stosować u osób z niewydolnością nerek, zaburzeniami rytmu serca, nadciśnieniem tętniczym, padaczką, myastheniagravis, nadczynnością gruczołu tarczowego, zwężeniem odźwiernika oraz u osób w podeszłym wieku;
-w czasie przyjmowania leku nie wolno pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby;
-lek należy przyjmować wyłącznie przed snem.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.