

## APAP przeziębienie Max 8 saszet.



Cena: 26,96 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	1g+50mg+12,2mg
Opakowanie	8 sasz.
Postać	prosz.
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Paracetamol, Coffeinum, Phenylephrinum

### Opis produktu

## Apap przeziębienie Max

to produkt leczniczy zawierający trzy substancje czynne: paracetamol, kofeinę i fenylefrynę.

### Skład

Substancjami czynnymi leku są: paracetamol, kofeina oraz fenylefryny chlorowodorek.

1 saszetka zawiera 1000 mg paracetamolu, 50 mg kofeiny oraz 12,2 mg fenylefryny chlorowodoru.

Pozostałe składniki to: sacharoza, sodu cytrynian, kwas cytrynowy, acesulfam potasowy (E950), aspartam (E951), żółcień chinolinowa (E104), aromat cytrynowy 87A06\*, aromat cytrynowy 875060\*\*, aromat cytrynowy 501.476.AP0504\*\*\*, aromat mentolowy 550469 TP0300\*\*\*\*, aromat mięty pieprzowej SC447995\*\*\*\*\*, żółcień pomarańczowa FCF (E110).

\*skład aromatu cytrynowego 87A069: substancje aromatyczne (w tym: koncentrat soku z cytryny (zawiera siarczyny), olejek cytrynowy, olejek limonkowy), naturalne substancje aromatyczne (zawiera m.in.: cytral, cytronelol, geraniol, limonen, linalol), odwodniony kukurydziany syrop glukozowy, modyfikowana skrobia kukurydziana (E1450), krzemu dwutlenek (E551).

\*\*skład aromatu cytrynowego 875060: substancje aromatyczne (w tym: olejek cytrynowy), naturalne substancje aromatyczne (zawiera m.in.: cytral, cytronelol, geraniol, limonen, linalol), odwodniony kukurydziany syrop glukozowy, guma akacjowa (E414), butylohydroksyanizol (E320).

\*\*\*skład aromatu cytrynowego 501.476 AP0504: mieszanina substancji aromatycznych i naturalnych substancji aromatycznych, maltodekstryna kukurydziana, sól sodowa oktenylobursztynianu skrobiowego (E1450), trioctan glicerolu (E1518), alfa-tokoferol (E307).

\*\*\*skład aromatu mentolowego 550469 TP0300: naturalny aromat miętowy, guma akacjowa (E414).

\*\*\*\*\*skład aromatu mięty pieprzowej SC447995: naturalny aromat miętowy, maltodekstryna kukurydziana, guma akacjowa (E414), syrop sorbitolowy (E420).

## Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub wg zaleceń lekarza, lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: 1 saszetka w razie konieczności dawkę można powtarzać, lecz nie częściej niż co 4-6 godzin.

Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance gorącej, ale nie wrzącej wody. Mieszać aż do rozpuszczenia. Pozostawić do ostygnięcia do temperatury umożliwiającej wypicie. Płyn należy wypić, gdy jest ciepły.

## Działanie

Apap przeziębienie Max jest lekiem przeciwbólowym, przeciwgorączkowym do stosowania w przeziębieniu i grypie.

## Wskazania

Apap przeziębienie Max stosuje się w krótkotrwałym leczeniu objawowych dolegliwości związanych z nieżytem błony śluzowej nosa i zapalenia zatok.

## Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Apap przeziębienie Max:

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol, kofeinę, fenylefrynę lub inne leki o podobnym działaniu albo na którykolwiek z pozostałych składników tego leku,  
jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby lub nerek,  
jeśli u pacjenta występowała kiedykolwiek choroba wrzodowa żołądka,  
jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia sercowo-naczyniowe,  
w okresie ciąży i karmienia piersią.

## Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1-10 na 10000 leczonych pacjentów): niedokrwistość, obrzęki, ostre i

przewlekłe zapalenie trzustki, krwotok, bóle brzucha, biegunka, nudności, wymioty, świąd, wysypka, pocenie się, pokrzywka, nefropatie.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10000 pacjentów): niewydolność wątroby, martwica wątroby, żółtaczk.

Możliwe działania niepożądane leku ze względu na obecność fenylefryny:

Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1-10 na 100 leczonych pacjentów): nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, jadłowstręt.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1-10 na 10000 leczonych pacjentów): świąd, pokrzywka, reakcje alergiczne i nadwrażliwości aż do objawów wstrząsu anafilaktycznego i skurczu oskrzeli.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10000 pacjentów): lęk, niepokój, drżenia, nerwowość, bezsenność, rozdrażnienie, zawroty i bóle głowy.

Częstość nieznaną działań niepożądanych: zatrzymanie moczu.

Po zastosowaniu kofeiny występowały: kołatanie serca, nagłe zaczerwienienie, wysokie ciśnienie tętnicze krwi, częstoskurcz.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności

Produkt leczniczy zawiera paracetamol. Ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić, czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu.

W czasie przyjmowania leku nie wolno pić alkoholu. Stosowanie leku przez osoby z niewydolnością wątroby, nadużywające alkoholu lub głodzone stwarza ryzyko toksycznego uszkodzenia wątroby.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

## Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie, lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Oddziaływanie leku Apap przeziębienie Max z innymi lekami wynika z oddziaływania substancji czynnych wchodzących w skład leku.

## Ciąża i karmienie piersią

W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Leku nie stosować w okresie ciąży.

Nie stosować w okresie karmienia piersią.

## Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

## Prowadzenie pojazdów i maszyn

Podczas stosowania leku Apap przeziębienie Max należy zachować ostrożność w trakcie prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.