

Aspar Espefa Premium 0,25g+0,25g 50 tabl.



Cena: 4,65 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,25g+0,25g
Opakowanie	50 tabl. (blistry)
Postać	tabl.
Producent	CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY ESPEFA
Rejestracja	
Substancja czynna	Magnezii hydroaspartas, Kalii hydroaspartas

Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: lek
PRODUCENT: ESPEFA
ILOŚĆ: 50 tabletek

ASPAR ESPEFA PREMIUM

DZIAŁANIE:

Uzupełnianie niedoborów magnezu i potasu (nie wymagających podawania pierwiastków drogą dożylną)

WSKAZANIA:

przy niemiarowościach i nadpobudliwości serca, zwłaszcza na tle niedoboru magnezu i potasu;
profilaktycznie w chorobie niedokrwiennej serca, przy zagrożeniu zawałem;
w rekonwalescencji pozawałowej;
po przebytych chorobach zakaźnych lub zabiegach chirurgicznych, w przebiegu których doszło do utraty magnezu i potasu;
jako produkt leczniczy przeciwdziałający ubocznym skutkom długotrwałego stosowania glikozydów nasercowych i leków moczopędnych (np. tiazydów, furosemidu).

DAWKOWANIE:

Lek stosuje się doustnie. Zalecana dawka to 2 do 6 tabletek na dobę w dawkach podzielonych. Przyjmuje się, że całkowite dzienne zapotrzebowanie organizmu na magnez nie przekracza 5 mg/kg masy ciała, a przy zapobieganiu niedoborom potasu podaje się do 780 mg jonów na dobę

SKŁAD:

Substancjami czynnymi leku są magnezu wodorooasparaginian (Magnezii hydroaspartas) oraz potasu wodorooasparaginian (Kalii

hydroaspartas). 1 tabletkę zawiera 250 mg magnezu wodorooasparaginyanu oraz 250 mg potasu wodorooasparaginyanu, co odpowiada 17 mg jonów magnezu oraz 54 mg jonów potasu. Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: powidon, kroscarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, talk, magnezu stearynian.

OSTRZEŻENIA:

Przed rozpoczęciem stosowania Aspar Espefa Premium należy omówić to z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność stosując Aspar Espefa Premium: - przy długotrwałym stosowaniu i w razie ciężkiej biegunki oraz u pacjentów leczonych glikozydami nasercowymi; należy wówczas kontrolować poziom magnezu i potasu w surowicy krwi, a w razie potrzeby także w erytrocytach; - u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka. Leku nie należy podawać w chorobach nowotworowych bez porozumienia z lekarzem.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.