

# Aspirin C Forte, 800 mg+480 mg, tab. musujące



Cena: 34,56 PLN

## Opis słownikowy

Dawka	0,8g+0,48g
Opakowanie	10 tabl.
Postać	Tabletki musujące
Producent	BAYER SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Acidum acetylsalicylicum, Acidum ascorbi

## Opis produktu

**Aspirin C Forte, 800 mg + 480 mg, tabletki musujące, 10 szt.**

Silne działanie i szybka pomoc w stanach przeziębienia i grypy.

### Działanie

Lek **Aspirin C Forte** działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo.

### Opis

**Aspirin C Forte** – produkt leczniczy zawiera w swoim składzie kwas acetylosalicylowy, który działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo. Zawartość witaminy C dodatkowo wzmacnia system odpornościowy organizmu. Musująca postać tego **leku na przeziębienie i grype** przyspiesza jego wchłanianie.

### Wskazania

Wskazaniami do stosowania jest objawowe leczenie dolegliwości bólowych o małym lub umiarkowanym nasileniu (np. bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśniowe) oraz objawowe leczenie dolegliwości bólowych, **stanów zapalnych** i **gorączki** w przebiegu przeziębienia i **grypy**.

#### Przeciwwskazania

Kiedy nie przyjmować leku **Aspirin C Forte**:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli pacjent ma skazę krwotoczną (skłonność do krwawień),
- jeśli pacjent ma ostrą chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy,
- jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność serca, wątroby lub nerek,
- jeśli kiedykolwiek występowały u pacjenta napady astmy oskrzelowej wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych,
- jeśli pacjent jest leczony metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych (lek stosowany m.in. w leczeniu niektórych nowotworów oraz reumatoidalnego zapalenia stawów),
- jeśli pacjentka jest w ostatnim trymestrze ciąży,
- u dzieci i młodzieży.

#### Skład

Substancjami czynnymi leku są kwas acetylosalicylowy (*Acidum acetylsalicylicum*) i kwas askorbowy (*Acidum ascorbicum*).

1 tabletkę musującą zawiera 800 mg kwasu acetylosalicylowego i 480 mg kwasu askorbowego.

Substancje pomocnicze: sodu wodorowęglan modyfikowany: sodu wodorowęglan, sodu węglan; kwas cytrynowy bezwodny, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna.

#### Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza bądź farmaceuty.

Lek do podawania doustnego.

**Dorośli:** jednorazowo 1 tabletkę musującą.

W razie konieczności dawkę jednorazową można powtarzać co 4-8 godzin.

Nie należy przyjmować więcej niż 3 tabletki musujące na dobę.

Tabletkę musującą należy rozpuścić w szklance wody i wypić musujący płyn. Przyjmować po posiłkach.

Leku nie należy stosować dłużej niż 4 dni bez konsultacji z lekarzem.

### Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie stosować u dzieci i młodzieży z uwagi na ilość substancji czynnych zawartych w jednej tabletkce musującej.

### Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

### Częstość nieznana:

- bóle żołądka i brzucha,
- zgaga,
- nudności i wymioty,
- niestrawność,
- zaburzenia czynności wątroby,
- zawroty głowy i szumy uszne,
- zwiększone ryzyko krwawień,
- hemoliza i niedokrwistość hemolityczna,
- zaburzenia czynności nerek i ciężka niewydolność nerek,
- pokrzywka,
- wysypka.

### Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

**Aspirin C Forte** może wchodzić w interakcje z:

- metotreksatem,
- lekami przeciwzakrzepowymi,
- niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi,
- lekami przeciwcukrzycowymi,
- lekami stosowanymi w leczeniu nadciśnienia tętniczego,
- lekami moczopędnymi.

### Stosowanie z jedzeniem i pić

Nie należy przyjmować leku **Aspirin C Forte** z alkoholem, ponieważ może on zwiększyć ryzyko działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego.

### Środki ostrożności

- Lek **Aspirin C Forte** zawiera sód, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.
- Przed rozpoczęciem przyjmowania **Aspirin C Forte** należy omówić z lekarzem kwestię jednoczesnego stosowania leków zapobiegających krzepnięciu krwi, występowania zaburzeń

- czynności wątroby, nerek lub krążenia bądź przebytej choroby wrzodowej.
- Pacjenci przed zabiegami chirurgicznymi, powinni poinformować o przyjmowaniu leku **Aspirin C Forte** lekarza, chirurga, anestezjologa lub dentystę.
  - Długotrwałe przyjmowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy może być przyczyną bólu głowy, który nasila się podczas przyjmowania kolejnych dawek.
  - Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
  - Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Leku **Aspirin C Forte** nie należy stosować w ostatnim trymestrze ciąży, ponieważ może powodować powikłania w okresie okołoporodowym, zarówno u matki jak i u noworodka.

Nie należy stosować leków zawierających kwas acetylosalicylowy u kobiet w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Kwas acetylosalicylowy przenika w niewielkiej ilości do mleka kobiet, dlatego nie zaleca się przyjmowania leku **Aspirin C Forte** podczas karmienia piersią.

#### Wpływ na płodność

**Aspirin C Forte** należy do grupy leków, które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia.