

Aspirin Pro, 500 mg, tabletki powlekane, 8 szt.



Cena: 11,23 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,5 g
Opakowanie	8 tabl.
Postać	tabl.powl.
Producent	BAYER SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Acidum acetylsalicylicum

Opis produktu

Aspirin Pro, 500 mg, tabletki powlekane, 8 szt.

[Sprawdzony sposób na ból.](#)

Działanie

Lek **Aspirin Pro** zawiera kwas acetylosalicylowy. Kwas acetylosalicylowy jest lekiem przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.

Opis

Aspirin Pro – produkt leczniczy zawierający kwas acetylosalicylowy, który działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo.

Wskazania

Lek **Aspirin Pro** stosuje się w objawowym leczeniu **gorączki** lub bólu o małym bądź umiarkowanym nasileniu, np. ból głowy, dolegliwości

towarzyszące przeziębieniu i **grypie, stany zapalne**, bóle zębów, bóle mięśni.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Aspirin Pro:

- jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli kiedykolwiek występowały u pacjenta napady astmy oskrzelowej lub reakcja alergiczna (np. pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, ciężki nieżyt nosa, wstrząs) wywołane podaniem kwasu acetylosalicylowego lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych,
- jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy,
- jeśli u pacjenta występuje skaza krwotoczna lub istnieje podwyższone ryzyko krwawienia,
- jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność nerek, wątroby lub serca,
- jeśli pacjent jest leczony metotreksatem w dawkach większych niż 20 mg na tydzień,
- jeśli pacjent jest leczony doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (leki rozrzedzające krew i zapobiegające jej krzepnięciu),
- jeśli pacjentka jest po piątym miesiącu ciąży (ponad 24 tygodnie bez miesiączki).

Skład

Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy (*Acidum acetylsalicylicum*).

1 tabletkę zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego.

Substancje pomocnicze: rdzeń tabletki: krzemionka koloidalna bezwodna, sodu węglan bezwodny; otoczka: воск Carnauba, hypromeloza, cynku stearynian.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza bądź farmaceuty.

Tylko do podawania doustnego.

Dorośli i młodzież powyżej 16. roku życia: jednorazowo 1 tabletkę. W razie potrzeby dawkę tę można przyjąć ponownie po upływie co najmniej 4 godzin. W przypadku bardziej nasilonej gorączki lub bólu zalecana pojedyncza dawka wynosi 2 tabletki, w razie potrzeby dawkę tę można przyjąć ponownie po upływie co najmniej 4 godzin.

Łączna dawka dobową nie powinna być większa niż 6 tabletek.

Dorośli w podeszłym wieku (65 lat i więcej): jednorazowo 1 tabletkę, w razie potrzeby dawkę tę można

przyjąć ponownie po upływie co najmniej 4 godzin.

Łączna dawka dobową nie powinna być większa niż 4 tabletki.

Młodzież w wieku 12-15 lat (u osób o masie ciała 40-50 kg): jednorazowo 1 tabletkę, w razie potrzeby dawkę taką można przyjąć ponownie po upływie co najmniej 4 godzin.

Łączna dawka dobową nie powinna być większa niż 6 tabletek.

Nie należy przyjmować tego leku dłużej niż przez 3 dni (w przypadku gorączki) lub 3-4 dni (w przypadku bólu), chyba że lekarz zaleci inaczej.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie należy stosować leku **Aspirin Pro** u dzieci poniżej 12. roku życia.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana:

- krwawienie z nosa, dziąseł,
- bóle głowy, zawroty,
- bóle brzucha,
- podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych,
- pokrzywka, reakcje skórne.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Aspirin Pro może wchodzić w interakcje z:

- niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi,
- lekami trombolitycznymi,
- lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego,
- lekami moczopędnymi,
- lekami stosowanymi w zaburzeniach czynności nerek,
- lekami działającymi miejscowo na przewód pokarmowy.

Stosowanie z jedzeniem i pić

Nie należy stosować leku **Aspirin Pro** z alkoholem.

Środki ostrożności

- Przed rozpoczęciem stosowania **Aspirin Pro** należy poradzić się lekarza, jeśli pacjent jest leczony innymi lekami zawierającymi kwas acetylosalicylowy, regularnie stosuje leki przeciwbólowe, jeśli u pacjenta występowała w przeszłości choroba wrzodowa bądź występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby,
- **Aspirin Pro** zawiera sól.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.
- Lek **Aspirin Pro** należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego lub jakiegokolwiek innego leku.

W okresie pierwszych pięciu miesięcy ciąży należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

Od rozpoczęcia szóstego miesiąca ciąży nie należy w żadnym przypadku przyjmować tego leku, ponieważ może to spowodować znaczne zagrożenie dla pacjentki lub jej dziecka.

Ten lek może przenikać do mleka matki, nie zaleca się przyjmowania leku **Aspirin Pro** podczas karmienia piersią.

Wpływ na płodność

Preparat ten należy do grupy leków, które mogą niekorzystnie wpływać na płodność kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.