

Biotebal Max 10mg 60 tabl.

Cena: 48,74 PLN



Opis słownikowy

Dawka	0,01 g
Opakowanie	60 tabl.
Postać	tabl.
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	
Substancja czynna	Biotinum

Opis produktu

Biotebal Max

to lek, zawierający biotynę, czyli witaminę z grupy B. Biotebal Max stosuje się w niedoborach biotyny, mogące objawiać się np. wypadaniem włosów, zaburzeniami wzrostu paznokci czy stanami zapalnymi skóry w okolicach ust, nosa, oczu i uszu.

Skład

Substancją czynną leku jest biotyna (Biotinum). 1 tabletkę zawiera 10 mg biotyny. Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, celuloza mikrokryształiczna, powidon K30, kroscarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek podaje się doustnie. Zalecane dawkowanie Biotebalu Max dla osób dorosłych to 5 lub 10 mg na dobę. Czas trwania leczenia to około 4 tygodnie, ale zależy on od stanu pacjenta.

Działanie

Działanie Biotebalu Max polega na uzupełnianiu niedoborów biotyny, będącej witaminą z grupy B, rozpuszczalną w wodzie. Biotyna wspiera powstawanie kreatyny i różnicowanie się komórek włosów, paznokci i naskórka.

Wskazania

Wskazaniem do zastosowania Biotebalu Max jest niedobór biotyny, objawiający się między innymi: zaburzeniami wzrostu paznokci i

włosów, stanami zapalnymi skóry w okolicach oczu, nosa, uszu czy ust, wypadaniem włosów.

Przeciwwskazania

Nie stosować Biotebalu Max u osób z nadwrażliwością na biotynę lub którykolwiek ze składników leku.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Biotebal Max może bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 osób) powodować działania niepożądane w postaci alergii (pokrzywki).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Biotebal Max posiada w składzie laktozę jednowodną i sól. W związku z tym, jeśli stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów to przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem. Biotebal Max zawiera mniej niż 23 mg sodu, więc uznaje się go za „wolny od sodu”.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Biotebal Max może wchodzić w interakcje z:

- lekami przeciwdrgawkowymi,
- kwasem pantotenowym,
- kwasem pionowym,
- alkoholem,
- hormonami steroidowymi,
- antybiotykami,
- awidyną,
- kwas nikotynowy (palenie papierosów).

Stosowanie leku z jedzeniem i pićciem

Podczas przyjmowania leku nie należy jednocześnie spożywać surowego białka jaja kurzego, ponieważ może to spowodować zahamowanie wchłaniania biotyny. Alkohol powoduje zmniejszenie stężenia biotyny we krwi.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować Biotebalu Max w czasie ciąży i karmienia piersią.

Wpływ na badania laboratoryjne

Lek wpływa na wynik badań laboratoryjnych. Należy odstawić lek na 3 dni przed badaniem, ewentualnie stosować się do zaleceń laboratorium.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Lek nie jest przeznaczony dla młodzieży i dzieci.