

Bronchosol Solid 37,5mg+75mg 20 tabl.

Cena: 24,19 PLN



Opis słownikowy

Dawka	37,5mg+75mg
Opakowanie	20 tabl.
Postać	tabl.powl.
Producent	PHYTOPHARM KLĘKA S.A.
Rejestracja	
Substancja czynna	Primulae radice extractum siccum, Thymus vulgaris

Opis produktu

Bronchosol Solid

tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany jako środek wykrztuśny w kaszlu związanym z przeziębieniem.

Działanie: wykrztuśne.

Dawkowanie: podanie doustne. Młodzież w wieku powyżej 12 lat, dorośli i osoby w podeszłym wieku: 1 tabletkę 3 razy na dobę. Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 7 dni podczas stosowania produktu leczniczego, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Skład: 1 tabletkę zawiera: substancje czynne: 75 mg wyciągu suchego z Thymus vulgaris L. lub Thymus zygis L. herba (ziela tymianku) 6-10:1, rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (v/v) i 37,5 mg wyciągu suchego z Primula veris L. lub Primula elatior Hill. radix (korzenia pierwiosnka) 3,5-4,5:1, rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda. Pozostałe składniki: glukoza ciekła suszona rozpyłowo, krzemionka koloidalna bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, stearylofumaran sodu, hypromeloza, dwutlenek tytanu, talk, hydroksypropyloceluloza, makrogol 3350.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub inne rośliny z rodziny Lamiaceae, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności: w przypadku wystąpienia duszności, gorączki lub ropnej płwociny należy skonsultować się z lekarzem, lub farmaceutą. Zaleca się ostrożność u pacjentów z zapaleniem żołądka lub chorobą wrzodową żołądka. Jeśli objawy nasiliły się podczas stosowania produktu leczniczego, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Pacjenci z rzadkim zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku. Lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w jednej tabletkce powlekanej, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Interakcje z innymi lekami: brak danych. należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie, lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią: brak danych. Nie jest zalecane stosowanie leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: brak danych.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.