

Bronchosol syrop 100 ml



Cena: 15,31 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	100 ml
Postać	syrop
Producent	PHYTOPHARM KLĘKA S.A.
Rejestracja	Lek ziołowy
Substancja czynna	Primulae tinctura, Thymi extractum fluidum, Thymolum

Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: PHYTOPHARM

ILOŚĆ: 100 ml

OPIS:

Bronchosol to syrop naturalnego pochodzenia, który sprawdza się w przypadku infekcji górnych dróg oddechowych, którym towarzyszy kaszel.

DZIAŁANIE:

Dzięki zawartości wyciągu z zieleń tymianku, korzeni pierwiosnka oraz tymolu, syrop działa wykrztuśnie i pobudza wydzielanie śluzu w oskrzelach.

WSKAZANIA:

Tradycyjnie w kaszlu i utrudnionym odkrztuszaniu w przebiegu nieżytów górnych dróg oddechowych. Bronchosol jest tradycyjnym

lekiem roślinnym i jego skuteczność działania opiera się wyłącznie na doświadczeniu płynącym z długiego okresu stosowania leku.

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat stosowania leku: dzieciom w wieku 4-6 lat 3 razy dziennie po 2,5 ml; dzieciom w wieku 6-12 lat 3 razy po 5 ml leku, dzieciom w wieku 12-18 lat 3 razy dziennie po 10 ml, dorosłym 3 razy po 15 ml leku. Podawać syrop odmierzony załączoną miarką. Ostatnią dawkę leku podawać nie później niż 3 godziny przed snem. Przed użyciem wstrząsnąć.

SKŁAD:

100 ml syropu zawiera: substancje czynne: 4360 mg wyciągu gęstego złożonego (3:1; woda) z ziela tymianku i korzenia pierwiosnka (7,6/1 części) i 19,8 mg tymolu oraz substancje pomocnicze: cukier, woda oczyszczona, aromat pomarańczowy. Lek zawiera nie więcej niż 0,5% (m/m) etanolu.

OSTRZEŻENIA:

Nie stosować przy nadwrażliwości na tymol, pierwiosnek, tymianek lub którykolwiek składnik syropu; u dzieci, u których w wywiadzie stwierdza się ostre krupowe zapalenie krtani (acute obstructive laryngitis), również w przeszłości; w przypadku astmy.

Jeśli objawy nasilają się, wystąpi duszność, gorączka lub ropna wydzielina, należy konsultować się z lekarzem.

U osób, u których wcześniej stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów przed przyjęciem leku skontaktować się z lekarzem.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku podczas ciąży i laktacji, dlatego nie zaleca się stosowania u kobiet w tym okresie. Przed użyciem preparatu należy zasięgnąć opinii lekarza.

Nie stosować u dzieci poniżej 4 roku życia.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek u osób z objawami podrażnienia żołądka (nudności) i w zapaleniu oraz wrzodach żołądka.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.