

Canesten 500mg 1 kaps.dopoch.

Cena: 48,02 PLN



Opis słownikowy

Dawka	0,5 g
Opakowanie	1 kaps.
Postać	kaps.dopochw.miękka
Producent	BAYER SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Clotrimazolom

Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: lek
PRODUCENT: BAYER
ILOŚĆ: 1 szt.

Canesten, 500 mg

DZIAŁANIE:

Kapsułki dopochwowe miękkie Canesten to lek przeciwgrzybiczy stosowany w zakażeniach pochwy oraz żeńskich zewnętrznych narządów płciowych wywołanych przez mikroorganizmy, takie jak grzyby (zazwyczaj Candida), wrażliwe na klotrymazol.

WSKAZANIA:

Infekcje pochwy i żeńskich zewnętrznych narządów płciowych wywołanych przez mikroorganizmy, takie jak grzyby (zazwyczaj Candida), wrażliwe na klotrymazol.

Lek przeznaczony jest do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat.

DAWKOWANIE:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Canesten podaje się dopochwowo. Zalecane dawkowanie leku Canesten u kobiet dorosłych oraz dziewcząt powyżej 16 lat to 1 kapsułka umieszczona głęboko w pochwie przed snem. Stosowanie produktu należy zakończyć przed rozpoczęciem miesiączki. Nie stosować leku w czasie menstruacji. W przypadku, gdy objawy zakażenia drożdżakami występują również u partnera, to on także powinien poddać się miejscowemu leczeniu.

Jeśli po zastosowaniu Canestenu objawy nie ustąpią po 7 dniach to należy skonsultować się z lekarzem.

SKŁAD:

Substancją czynną leku jest klotrymazol.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: wypełnienie kapsułki: wazelina biała, parafina ciekła; otoczka kapsułki: żelatyna, glicerol, woda oczyszczona, tytanu dwutlenek (E171), żółcień chinolinowa (E104), żółcień pomarańczowa (E110), lecytyna sojowa, trójglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha.

OSTRZEŻENIA:

Nadwrażliwość na klotrymazol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 ChPL.
Canesten można stosować u dorosłych kobiet oraz w wieku powyżej 16 lat.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.