

Cetigran 10mg 10 tabl.



Cena: 5,31 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,01 g
Opakowanie	10 tabl.
Postać	tabl.powl.
Producent	AXXON SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Cetirizinum

Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: lek
PRODUCENT: AXXON
ILOŚĆ: 10 tabletek

Cetigran - 10 tabletek powlekanych

DZIAŁANIE:

Cetigran jest lekiem w postaci 10 tabletek powlekanych. Substancją czynną jest cetyryzyny dichlorowoderek. Produkt przeznaczony jest do stosowania podczas kataru siennego oraz alergii występujących przez cały rok. Lek ma działanie przeciwhistaminowe, czyli hamuje wydzielanie histaminy, substancji która odpowiada za alergie i uczulenia. Łagodzi objawy takie jak: kichanie, podrażnienie błony śluzowej nosa, katar, zatłoczony nos, swędzenie i zaczerwienienie oraz łzawienie oczu oraz wysypki skórne. Dla dzieci od 6 roku życia i osób dorosłych.

DAWKOWANIE:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: zalecana dawka leku to 10 mg (1 tabletkę) raz na dobę.
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: Zalecana dawka leku to 5 mg dwa razy na dobę (pół tabletki dwa razy na dobę).

SKŁAD:

Jedna tabletkę powlekana zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodoru (Cetirizini dihydrochloridum).
Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon, magnezu stearynian.
Skład otoczki: Opadry II White: laktoza jednowodna, hypromeloza, makrogol 3000, glicerolu trioctan, tytanu dwutlenek.

OSTRZEŻENIA:

Kiedy nie stosować leku Cetigran:

jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek (ciężka niewydolność nerek z klirensiem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min);

jeśli pacjent ma uczulenie na cetyryzynę dichlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny (substancje czynne o podobnej budowie, wchodzące w skład innych leków).

Nie należy podawać tego leku dzieciom w wieku poniżej 6 lat, ponieważ lek w postaci tabletek nie pozwala na odpowiednie dostosowanie dawkowania.

Należy unikać stosowania leku Cetigran u kobiet w ciąży. Przypadkowe przyjęcie leku przez kobietę w ciąży nie powinno mieć szkodliwego wpływu na płód. Jednak lek może być stosowany tylko w razie konieczności i po konsultacji z lekarzem.

Cetyryzyna przenika do mleka matki. Dlatego nie należy stosować leku Cetigran w okresie karmienia piersią, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.