

Chlorchinaldin VP 2 mg 20 tabletek do ssania

Cena: 16,43 PLN



Opis słownikowy

Dawka	2 mg
Opakowanie	20 tabl.
Postać	tabl.do ssania
Producent	PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Chlorquinaldolum

Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: VALEANT SYNOCROM

ILOŚĆ: 20 tabletek

OPIS:

Chlorchinaldin VP to preparat o działaniu odkażającym, stosowany miejscowo w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła.

DZIAŁANIE:

Substancją czynną preparatu jest chlorchinaldol, substancja odkażająca (antyseptyk) z grupy pochodnych chinoliny. Chlorchinaldol wykazuje działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwpierwotniakowe. Podstawą mechanizmu działania chlorchinaldolu jest prawdopodobnie wiązanie (chelatowanie) jonów metali, zwłaszcza żelaza, miedzi, manganu i cynku, niezbędnych dla przebiegu procesów metabolicznych patogennych drobnoustrojów.

WSKAZANIA:

Wskazany jest do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł, w pleśniawkach, w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami.

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zalecana dawka. Co 1 - 2 godziny ssać 1 tabletkę. Nie należy stosować dawki większej niż 10 tabletek do ssania na dobę. Nie rozgryzać tabletek.

SKŁAD:

Substancją czynną leku jest chlorochinaldol. Jedna tabletkę do ssania zawiera 2 mg chlorochinaldolu. Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy jednowodny, sacharoza, karmeloza sodowa, talk, magnezu stearynian.

OSTRZEŻENIA:

Lek zawiera sacharozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek może wpływać szkodliwie na zęby.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Leku nie należy stosować podczas posiłków.

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.