Cynarex 250mg 30 tabl

Cena: 19,20 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,25 g
Opakowanie	30 tabl.
Postać	tabl.
Producent	WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Rejestracja	
Substancja czynna	Cynareae herba extractum

Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: HERBAPOL WROCŁAW

ILOŚĆ: 30 tabletek

OPIS:

Cynarex to ziołowe tabletki zawierające wyciąg z karczocha, stosowany głównie przy niestrawności oraz osłabieniu wydzielaniu żółci.

DZIAŁANIE:

Żółciotwórcze, żółciopędne, preparat wykazuje również działanie ochronne na miąższ wątroby np. przy zatruciach dwusiarczkiem węgla.

WSKAZANIA:

Tradycyjnie stosuje się w niestrawności, osłabieniu wydzielania żółci. Pomocniczo w hipercholesterolemii jako środek obniżający poziom cholesterolu i trójglicerydów w surowicy krwi (profilaktyka miażdżycy) oraz tradycyjnie jako środek ochronny u osób narażonych na działanie substancji toksycznych wydalanych z żółcią (m.in. dwusiarczku węgla).

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Doustnie, dorośli i młodzież powyżej 14 lat: w niestrawności jednorazowo 2 tabletki, pomocniczo w hipercholesterolemii lub jako środek ochronny u osób narażonych na działanie substancji toksycznych wydalanych z żółcią (m.in. dwusiarczku węgla) 3 razy dziennie po 2 tabletki.

SKŁAD:

1 tabletka zawiera: wyciąg suchy z ziela karczocha 250mg (ekstrahent: etanol 50% v/v) oraz substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna z dodatkiem koloidalnego dwutlenku krzemu, krospowidon, magnezu stearynian, talk.

OSTRZEŻENIA:

Przeciwwskazaniem jest: nadwrażliwość na karczochy lub inne rośliny z rodziny Astrowatych (Compositae=Asteraceae) i niedrożność dróg żółciowych.

W przypadku stwierdzonej kamicy żółciowej preparat może być stosowany wyłącznie w porozumieniu z lekarzem.

Osoby, u których stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, przed przyjęciem leku powinny poradzić się lekarza.

Nie stosować u dzieci poniżej 14 roku życia.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.