

Dermopanten maść 0,05 g/g 30 g

Cena: 9,88 PLN



Opis słownikowy

Dawka	0,05 g/g
Opakowanie	30 g
Postać	maść
Producent	CHEMA-ELEKTROMET SPÓŁDZ.PRACY
Rejestracja	
Substancja czynna	Dexpanthenolum

Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: Lek
PRODUCENT: CHEMA RZESZÓW
ILOŚĆ: 30 g

DERMOPANTEN

DZIAŁANIE:

Regeneracja skóry.

WSKAZANIA:

Leczenie powierzchownych ran, takich jak otarcia, skaleczenia, pęknięcia skóry, oparzenia, podrażnienia skóry (np. po nadmiernym nasłonecznieniu, radioterapii, naświetlaniu lampą kwarcową), niewielkie zapalenia skóry, owrzodzenia. Produkt leczniczy jest wskazany szczególnie w leczeniu skóry suchej.

W pielęgnacji brodawek sutkowych w czasie karmienia piersią - zapobieganie i leczenie otarć oraz podrażnień brodawek sutkowych.

W pielęgnacji niemowląt - zapobieganie i leczenie odparzeń oraz zapaleń skóry.

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Do stosowania miejscowego na skórę. W leczeniu powierzchownych ran należy nakładać produkt leczniczy raz lub kilka razy na dobę, w zależności od stanu miejscowego. W pielęgnacji brodawek sutkowych kobiet karmiących piersią należy nakładać na brodawki kompres z maści, przy czym należy umyć brodawki przed każdym karmieniem piersią. W pielęgnacji niemowląt należy nakładać produkt leczniczy przy każdej zmianie pieluchy, po wcześniejszym przemyciu wodą miejsc narażonych na odparzenia.

SKŁAD:

1g maści zawiera: substancję czynną: deksopantenol 50mg oraz substancje pomocnicze: wazelina biała, воск biały, parafina ciekła, polisorbat 80, substancja poprawiająca zapach Nagietki Y66, woda oczyszczona.

OSTRZEŻENIA:

Nie należy stosować produktu leczniczego Dermopanten:

- w razie uczulenia (nadwrażliwości) na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą . W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości, w tym skórnych odczynów uczuleniowych, należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem;
- na duże, głębokie i wyraźnie zakażone rany. W takich przypadkach należy skontaktować się

z lekarzem.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.