

## Dicloziaja żel 11,6 mg/g 100 g



Cena: 10,62 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	0,0116 g/g
Opakowanie	100 g (tub.)
Postać	żel
Producent	ZIAJA LTD. Z.P.L. SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Diclofenacum

### Opis produktu

## Dicloziaja żel 11,6 mg/g 100 g

Żel przeciwbólowy i przeciwzapalny

Substancją czynną żelu Dicloziaja jest diklofenak dietyloamoniowy, należący do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Składnik ten wykazuje przede wszystkim działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Podłoże żelu to mieszanina wodno-alkoholowa, dzięki której żel charakteryzuje się właściwościami kojącymi i chłodzącymi.

Dicloziaja polecana jest dla osób, u których występują pourazowe stany zapalne ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów. Doskonale sprawdza się w przypadku nadwyrężeń lub stłuczeń, w bólach pleców, czy chorobie zwyrodnieniowej stawów.

Dicloziaja jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym przeznaczonym do miejscowego stosowania o działaniu przeciwbólowym. Preparat w postaci żelu działa kojąco i chłodząco ze względu na wodno-alkoholowe podłoże, w składzie zawiera diklofenak dietyloamoniowy.

Przeznaczony jest dla dorosłych oraz dzieci powyżej 14 r.ż. Stosuje się go w przypadku miejscowego leczenia objawowego w stanach ostrego nadwyrężenia, przy skręceniach i/lub stłuczeniach spowodowanych tępymi urazami. U dorosłych sprawdza się w pourazowych stanach zapalnych więzadeł, ścięgien, mięśni i stawów będących wynikiem skręceń, nadwyrężeń i/lub stłuczeń. Ponadto niweluje bóle pleców, stany zapalne tkanek miękkich, zapalenia ścięgien (np. łokieć tenisisty) oraz łagodne formy choroby zwyrodnieniowej stawów.

### Skład

1 g żelu zawiera 10 mg Diclofenacum - diklofenaku sodowego, karbomer 5984, dietanoloamina, makroglu eter cetostearylowy 20, kokozylokaprylokapronian, alkohol izopropylowy, glikol propylenowy, parafina ciekła lekka, kompozycja zapachowa Perfum cream

221085 PO, woda oczyszczona

## Wskazania

Preparat wykorzystywany jest do leczenia miejscowego zmian skórnych, do których należą: ograniczone i łagodne formy stanu zapalnego stawów, ograniczone postaci zapalenia tkanek miękkich, bólu pleców, pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni, a także stawów w wyniku urazów.

## Działanie

Diclozajia należy do grupy leków niesteroidowych, przeciwzapalnych, które wykazują właściwości łagodzące stany zapalne oraz bólowe. Diklofenak zatrzymuje czynność cyklooksygenazy prostaglandynowej. Po zastosowaniu neutralizuje dolegliwości spowodowane bólem oraz ogranicza wielkość obrzęku.

## Dawkowanie

Preparat przeznaczony jest do stosowania zewnętrznego, niewielką ilość preparatu 2-4 g nakładać, wcierając w miejsca, w których odczuwane jest źródło bóle, czynność powtarzać 3-4 razy na dobę.

Leku nie należy stosować dłużej niż przez 14 dni w przypadku pourazowych stanów zapalnych i reumatyzmu tkanki miękkiej i nie dłużej niż 4 tyg. w przypadku choroby zwyrodnieniowej stawów.

## Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na diklofenak lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Przeciwwskazany u osób, u których kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne wywołują napady astmy, pokrzywki oraz ostre nieżyty nosa.

Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 14 roku życia.

Nie stosować podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

