

# Etodal żel 0,1 g/g 50 g (tuba)



Cena: 16,16 PLN

## Opis słownikowy

Dawka	0,1 g/g
Opakowanie	50 g (tuba)
Postać	żel
Producent	ZIAJA LTD. Z.P.L. SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Etofenamatum

## Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: lek  
 PRODUCENT: ZIAJA  
 ILOŚĆ: 50g

Etodal, 0,1 g/g żel, 100 g

### DZIAŁANIE:

Żel jest lekiem zawierającym substancję czynną etofenamatum. Etofenamatum należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Stosowany miejscowo wchłania się przez skórę i gromadzi w zmienionych zapalnie tkankach

### WSKAZANIA:

Tępe urazów, takich jak: stłuczenia, skręcenia, naciągnięcia mięśni, ścięgien i stawów;

- chorób zwyrodnieniowych stawów kręgosłupa, kolanowych, barkowych;
- reumatyzmu pozastawowego:

Bóle okolicy krzyżowo-lędźwiowej,

Zmiany chorobowe w obrębie tkanek miękkich okołostawowych, tj. zapalenie kaletki maziowej, ścięgien, pochewek ścięgniowych, torebek stawowych (tzw. staw zamrożony),

Zapalenie nadkłykci.

Etodal jest wskazany do stosowania u dorosłych.

### DAWKOWANIE:

Żel należy nałożyć na obszar dotknięty bólem i delikatnie wcierać aż do całkowitego wchłonięcia się produktu leczniczego. W zależności od wielkości obszaru objętego bólem, należy zastosować pasek

produktu leczniczego Etodal długości 5 do 10 cm (co odpowiada około 1,7 do 3,3 g). Etodal należy stosować maksymalnie 3 do 4 razy na dobę.

Leczenie dolegliwości reumatycznych trwa zazwyczaj 3 do 4 tygodni, zaś tępych urazów (np. urazów sportowych) - do 2 tygodni.

Jeśli objawy utrzymują się lub nasilają w dowolnym momencie, należy skontaktować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży.

Sposób podawania

Podanie na skórę.

SKŁAD:

1 g żelu zawiera 100 mg etofenamatu.

Substancją pomocniczą o znanym działaniu: glikol propylenowy.

OSTRZEŻENIA:

Produktu leczniczego Etodal nie należy stosować:

- w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;
- w trzecim trymestrze ciąży

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.