

Flucontrol Hot 8 sasz.



Cena: 19,62 PLN

Opis słownikowy

Dawka	1g+0,01g+4mg
Opakowanie	8 sasz.a 5,5g
Postać	prosz.do sp.rozt.doust.
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Paracetamolum, Phenylephrini hydrochloridum, Chlorphenamini maleas

Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: lek
 PRODUCENT: AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
 ILOŚĆ: 8 saszetek

FluControl HOT

DZIAŁANIE:

FluControl Hot wywiera umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Produkt leczniczy może wywołać senność i sedację. Należy unikać wykonywania czynności wymagających dużej uwagi, takich jak prowadzenie samochodów czy obsługiwanie maszyn, które mogą stwarzać zagrożenie.

WSKAZANIA:

Leczenie objawowe przeziębienia i grypy, przebiegających z gorączką, słabym lub umiarkowanym bólem, obrzękiem błony śluzowej nosa z tworzeniem wydzieliny.

DAWKOWANIE:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Stosować doustnie. Zalecana dawka Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: jedna saszетка lecz nie częściej niż co 6-8 godzin (3 lub 4 razy na dobę). Nie należy stosować więcej niż 4 saszetki (4000mg paracetamolu+ 40 mg fenylefryny+ 16mg chlorfenaminy) w ciągu doby. W razie ustąpienia bólu lub gorączki należy zakończyć stosowanie leku FluControl Hot. Jeżeli gorączka występuje dłużej niż przez 3 dni leczenia, ból lub inne objawy dłużej niż 5 dni, albo objawy ulegają nasileniu lub pojawiają się nowe, należy zwrócić się do lekarza o poradę. Sposób podawania Rozpuścić zawartość saszetki w niewielkiej ilości płynu, najlepiej w połowie szklanki wody. Pacjenci z niewydolnością nerek lub wątroby Nie należy stosować leku FluControl Hot u pacjentów chorujących na choroby wątroby i ciężką niewydolność nerek. Stosowanie u dzieci Leku FluControl Hot

nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na jego dawkę. Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku FluControl Hot Jeżeli doszło do przyjęcia dawki przekraczającej dawkę zalecaną, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, ponieważ często objawy pojawiają się po trzech dniach od poknięcia, także w przypadkach ciężkiego zatrucia

SKŁAD:

1 saszetka zawiera:
1000 mg paracetamolu (Paracetamolum)
10 mg chlorowodorku fenylefryny (Phenylephrini hydrochloridum)
4 mg maleinianu chlorfenaminy (Chlorphenamini maleas)

OSTRZEŻENIA:**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
choroby wątroby (niewydolność wątroby lub bez) lub wirusowe zapalenie wątroby (zwiększone ryzyko hepatotoksyczności)
nadciśnienie tętnicze;
nadczynność tarczycy;
ciężkie choroby sercowo-naczyniowe (takie jak choroba wieńcowa, dławica piersiowa);
tachykardia;
pacjenci leczeni inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO);
jaskra;
zaburzenia rytmu serca;
ciężka niewydolność nerek.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.