

Gargarin 6 saszetek



Cena: 7,67 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	6 sasz.a 5g
Postać	pr.do sporządz.płynu do płuk.g
Producent	FARMINA SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	-

Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: FARMINA

ILOŚĆ: 6 saszetek

OPIS:

Gargarin to lek o działaniu antyseptycznym i miejscowo znieczulającym.

DZIAŁANIE:

Lek Gagarin tworzy pięć substancji czynnych, które wzajemnie się uzupełniają i wykazują kompleksowy efekt terapeutyczny. Tetraboran sodu i benzoesan sodu posiadają właściwości bakteriostatyczne, grzybobójcze i odkażające. Wodorowęglan sodu intensyfikuje wydzielanie gruczołów śluzowych dróg oddechowych, ułatwia rozpuszczanie zalegających mas śluzowych i działa miejscowo przeciwzapalnie. Z kolei chlorek sodu odpowiada za zapewnienie równowagi elektrolitowej i posiada właściwości słabo odkażające. Mentol wykazuje działanie chłodzące, znieczulające i odkażające. Gagarin jest lekiem dostępnym bez recepty.

WSKAZANIA:

Leczenie pomocnicze stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

5 g proszku (1 saszetkę) rozpuścić w szklance wody i płukać jamę ustną. Płukanie powtarzać 2-3 raz na dobę.

SKŁAD:

5 g proszku zawiera: 1,74 g boraksu, 1,74 g sodu wodorowęglanu, 0,75 g sodu chlorku, 0,75 g sodu benzoesanu, 0,02 g lewomentolu.

OSTRZEŻENIA:

Nie stosować leku Gargarin w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku, w przypadku uszkodzonej błony śluzowej jamy ustnej.

Leku nie należy połykać!

Długotrwałe stosowanie (szczególnie na rozległe uszkodzenia błony śluzowej) może powodować kumulowanie się boraksu w organizmie i ryzyko zatrucia.

Lek zawiera benzoesan sodu - miejscowe podanie może powodować podrażnienie oczu, skóry, błon śluzowych.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 stopni C.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.