Ginkofar Extra 240 mg 60 tabletek

Cena: 96,88 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,24 g
Opakowanie	60 tabl.
Postać	tabl.powl.
Producent	BIOFARM SP.Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Ginkgonis extractum siccum raffinatum et

Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: BIOFARM

ILOŚĆ: 60 tabletek

OPIS:

Ginkofar Extra dedykowany jest osobom starszym, które z wiekiem tracą dawną sprawność umysłu.

DZIAŁANIE:

Lek Ginkofar Extra zawiera kwantyfikowany wyciąg z liści miłorzębu japońskiego, który poprawia przepływ krwi w mózgu, rozszerza naczynia krwionośne i zapobiega agregacji płytek. Za substancje czynne wyciągu uważa się glikozydy flawonowe, ginkgolidy oraz bilobalid.

WSKAZANIA:

W celu poprawy zdolności poznawczych u osób starszych (osłabienie pamięci i sprawności umysłowej związane z wiekiem), w celu

poprawy jakości życia w łagodnej demencji.

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

1 tabletkę na dobę. Leczenie powinno trwać co najmniej 8 tygodni. Jeżeli po 3 miesiącach stosowania preparatu nie następuje poprawa lub jeżeli nastąpiło pogorszenie objawów, należy zwrócić się do lekarza w celu ustalenia czy kontynuacja leczenia jest uzasadniona. Produkt leczniczy Ginkofar Extra przyjmuje się doustnie. Tabletki należy połknąć, popijając wodą. Można je przyjmować niezależnie od posiłków.

SKŁAD:

1 tabletka zawiera 80 mg suchego ekstraktu z liści miłorzębu japońskiego Ginkgo biloba L. (35-67:1), standaryzowanego na zawartość od 22% do 27% ginkgoflawonoglikozydów i od 5% do 7% laktonów terpenowych w tym 2,8% do 3,4% ginkgolidów A, B, i C oraz 2,6% do 3,2% bilobalidu i nie więcej niż 5 ppm kwasów ginkgolowych; ekstrahent: aceton 60% m/m. oraz substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, powidon, krospowidon, magnezu stearynian, bezwodna krzemionka koloidalna, alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek, makrogol 4000, talk, tlenek żelaza żółty.

OSTRZEŻENIA:

Nie stosować leku Ginkofar Extra, jeśli pacjent ma uczulenie na wyciąg z liścia miłorzębu japońskiego lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; jeśli pacjentka jest w ciąży.

Osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe lub przeciwpłytkowe (tzw. leki rozrzedzające krew), powinny skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

Przed zabiegiem operacyjnym należy poinformować lekarza lub stomatologa o stosowaniu leku.

Zaleca się przerwać stosowanie leku przynajmniej 3-4 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym lub stomatologicznym, np. wyrwanie zęba.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z padaczką.

Odradza się przyjmowania leku razem z alkoholem.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.