

# Groprinosin Forte syrop 0,5g/5ml 150ml

Cena: 28,27 PLN



## Opis słownikowy

Dawka	0,5 g/5ml
Opakowanie	150 ml (butelka)
Postać	syrop
Producent	GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Inosinum pranobexum

## Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: Lek  
PRODUCENT: GEDEON RICHTER  
ILOŚĆ: 150 ml

Groprinosin Forte, 500 mg/ 5 ml, syrop

### DZIAŁANIE:

Groprinosin Forte jest lekiem przeciwwirusowym i zwiększającym odporność organizmu (pobudza czynność układu odpornościowego).

### WSKAZANIA:

Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. W leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex). Lek Groprinosin Forte może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej.

### DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy stosować doustnie.

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)  
Zalecana dawka dobową wynosi 50 mg/kg masy ciała na dobę (0,5 ml syropu na 1 kg masy ciała na dobę), zwykle 3 g (czyli 30 ml syropu) na dobę, podawane w 3 lub 4 dawkach podzielonych. Dawka maksymalna wynosi 4 g inozyny pranobeks na dobę (czyli 40 ml

syropu na dobę).

Dzieci powyżej 1 roku życia

Zazwyczaj zalecana dawka wynosi 50 mg/kg masy ciała na dobę (0,5 ml syropu na 1 kg masy ciała na dobę) w 3 lub 4 równych podzielonych dawkach podawanych w ciągu doby.

Poniższa tabela przedstawia dawkowanie w zależności od masy ciała pacjenta.

Masa ciała dziecka Dawkowanie na dobę

10 - 14 kg 3 x 2,5 ml syropu\*

15 - 20 kg 3 x 2,5 do 3,5 ml syropu\*

21 - 30 kg 3 x 3,5 do 5 ml syropu\*

31 - 40 kg 3 x 5 do 7,5 ml syropu\*

41- 50 kg 3 x 7,5 do 9 ml syropu\*

\* W celu odmierzenia zalecanej objętości, należy stosować dołączoną do opakowania miarkę o pojemności 20 ml, z podziałką co 2,5 ml.

#### SKŁAD:

Substancją czynną leku jest inozyny pranobeks. Jeden ml syropu zawiera 100 mg inozyny pranobeksu.

- Pozostałe składniki to: metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), maltitol ciekły (E 965) (maltitol, sorbitol), sacharyna sodowa (E 954), sukraloza (E 955), sodu wodorotlenek, kwas cytrynowy jednowodny, woda oczyszczona, aromat malinowy L-144739 (cukry, glikol propylenowy, etanol, naturalne substancje aromatyzujące) oraz aromat malinowy 10721-31 (dietylu malonian, etylu octan, aldehyd octowy, trans-2 heksanal,  $\beta$ -Damascenon, maltodekstryna skrobiowa, guma arabska).

#### OSTRZEŻENIA:

Nie należy stosować leku u dzieci poniżej 1 roku życia.

Nie należy stosować produktu, jeśli występuje nadwrażliwość na jakikolwiek ze składników. Preparat nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 1 roku życia, kobiet w ciąży i karmiących piersią, pacjentów zmagających się z dną moczanową.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Każdy lek może wywołać reakcję alergiczną, jednakże ciężkie reakcje alergiczne po przyjęciu leku Groprinosin Forte występują bardzo rzadko.

Należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, jeżeli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów:

- nagle pojawiający się świszczący oddech,
- trudności w oddychaniu,
- obrzęk powiek, twarzy, warg,
- wysypka lub świąd (zwłaszcza jeśli dotyczą całego ciała).

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.