

## Ibument żel (0,05 g+0,03 g)/g tuba 50 g

Cena: 11,18 PLN



## Opis słownikowy

Dawka	(0,05g+0,03g)/g
Opakowanie	1 tub.a 50g
Postać	żel
Producent	ZIAJA LTD. Z.P.L. SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Ibuprofenum, Levomentholum

## Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: ZIAJA

ILOŚĆ: 50 g

## OPIS:

Ibument to lek w postaci żelu na ból i obrzęki wskutek uszkodzeń powysiłkowych czy urazów sportowych.

## DZIAŁANIE:

Ibument Żel to lek o miejscowym działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym, który zawiera w swym składzie substancje czynne ibuprofen (50 mg w 1 g żelu) i lewomentol (30 mg w 1 g żelu). Ibuprofen to niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ), który ogranicza stan zapalny w miejscu zmienionym chorobowo, działa łagodząco na ból i redukuje obrzęk. Z kolei Lewomentol wykazuje miejscowe działanie znieczulające oraz powoduje miejscowe przekrwienie tkanek. Skojarzone działanie obu składników powoduje, że po naniesieniu na skórę żelu następuje bardzo szybkie uśmierzenie bólu, utrzymujące się przez kilka godzin.

## WSKAZANIA:

Leczenie bólu i obrzęków wskutek uszkodzeń powysiłkowych, urazów stawów z naderwaniem więzadeł (skręceń stawów), kontuzji sportowych.

#### DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Żel należy nałożyć na bolące miejsce i delikatnie wmasować, aż do wchłonięcia leku. Jednorazowo należy stosować 1 do 4 cm żelu. W razie konieczności powtarzać, maksymalnie do 3 razy na dobę. Nie stosować żelu częściej, niż co 4 godziny.

#### SKŁAD:

Substancja czynna: ibuprofen i lewomentol. 1 gram żelu zawiera 50 mg ibuprofenu i 30 mg lewomentolu. Substancje pomocnicze: etanol 96%, karbomer 980, glikol propylenowy, diizopropanolamina 85%, woda oczyszczona.

#### OSTRZEŻENIA:

Nie stosować, jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen, lewomentol, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, u osób z astmą, u których występowały w przeszłości napady duszności, wysypka, nieżyt błony śluzowej nosa po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Żel nie powinien być stosowany na błony śluzowe, na uszkodzoną lub zmienioną zapalnie skórę, na okolice oczu.

Przerwać stosowanie leku, jeśli wystąpi pokrzywka i poradzić się lekarza.

Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat.

Ibument należy stosować ostrożnie u kobiet w ciąży ze względu na możliwość opóźnienia wystąpienia spontanicznej akcji porodowej i wydłużenia czasu trwania porodu.

Ibument należy stosować ostrożnie u kobiet w czasie karmienia piersią.

Ryzyko działań niepożądanych oraz przenikania do mleka ludzkiego są niskie.

Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

**Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.**