

Ibuvit D3 2000 IU 60 kaps.miękk



Cena: 27,06 PLN

Opis słownikowy

Dawka	2 000 I.U.
Opakowanie	60 kaps.
Postać	kaps.miękkie
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	
Substancja czynna	Cholecalciferolum

Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: Lek
PRODUCENT: POLPHARMA
ILOŚĆ: 60 kapsułek miękkich

Ibuvit D3 2000 IU x 60 kaps.

ZASTOSOWANIE:

Profilaktyka niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru witaminy D (np. krzywica, osteomalacja) u dorosłych z prawidłową masą ciała oraz dzieci i młodzieży z prawidłową masą ciała w wieku 11 lat i powyżej. Leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych. Profilaktyka niedoboru witaminy D u kobiet planujących ciążę, w ciąży i karmiących piersią, w porozumieniu z lekarzem.

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

1-2 kapsułki dziennie. Dienne dawkowanie może być modyfikowane zgodnie ze wskazaniem lekarza. W celu otworzenia kapsułki należy przekroczyć i oderwać końcówkę, a następnie wycisnąć zawartość bezpośrednio do jamy ustnej, napoju lub przygotowanego posiłku. Należy delikatnie nacisnąć kapsułkę, by nie doprowadzić do gwałtownego rozprysku płynu. Zawartość kapsułki należy zużyć bezpośrednio po otworzeniu. Osoby dorosłe mogą połykać kapsułkę w całości.

SKŁAD:

1 kapsułka zawiera 50 mikrogramów (2000 IU) cholekalcyferolu (witaminy D3).

OSTRZEŻENIA:

Nie stosować, jeśli kiedykolwiek wcześniej wystąpiła nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników.

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.

Zrównoważony sposób żywienia prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.

Preparat należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze 15-25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Produkt należy przyjmować pod nadzorem lekarza.

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Zawartość kapsułki należy zużyć bezpośrednio po otwarciu.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.