

inVag 14 kapsułek dopochwowych

Cena: 64,20 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	14 kapsułek
Postać	kaps.dopochwowe
Producent	INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED S.A.
Rejestracja	

Opis produktu

INVAG® kapsułki dopochwowe przeznaczone dla kobiet w celu przywrócenia lub uzupełnienia flory bakteryjnej i utrzymania właściwego pH pochwy. Lek zaleca się stosować:

- w zapobieganiu infekcjom układu moczowo-płciowego (w trakcie i po systemowych kuracjach antybiotykami i innymi lekami przeciwdrobnoustrojowymi oraz w okresie klimakterium i po porożu),
- profilaktycznie we wszelkich sytuacjach, w których dochodzi do zaburzenia równowagi flory pochwy (np. niewłaściwe przyzwyczajenia higieniczne, antykoncepcja),
- wspomagająco w leczeniu stanów zapalnych pochwy (zakażenia pochwy), w trakcie i po leczeniu antybiotykami, innymi lekami przeciwdrobnoustrojowymi (także podczas leczenia upławów).

Lek przeznaczony dla kobiet.

Skład

Każda kapsułka zawiera nie mniej niż 109CFU (Jednostek tworzących kolonie) bakterii kwasu mlekowego: 25% Lactobacillus fermentum 57A, 25% Lactobacillus plantarum 57B, 50% Lactobacillus gasseri 57C.

Substancje pomocnicze: odtłuszczone mleko w proszku, sacharoza, sodu L-glutaminian, mannitol, laktoza jednowodna, magnezu stearynian. Składniki kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek.

Wskazania

INVAG® kapsułki dopochwowe przeznaczone dla kobiet w celu przywrócenia lub uzupełnienia flory bakteryjnej i utrzymania właściwego pH pochwy.

Działanie

- w zapobieganiu infekcjom układu moczowo-płciowego (w trakcie i po systemowych kuracjach antybiotykami i innymi lekami przeciwdrobnoustrojowymi oraz w okresie klimakterium i po porożu),
- profilaktycznie we wszelkich sytuacjach, w których dochodzi do zaburzenia równowagi flory pochwy (np. niewłaściwe przyzwyczajenia higieniczne, antykoncepcja),
- wspomagająco w leczeniu stanów zapalnych pochwy (zakażenia pochwy), w trakcie i po leczeniu antybiotykami, innymi lekami przeciwdrobnoustrojowymi (także podczas leczenia upławów).

Lek przeznaczony dla kobiet.

Dawkowanie

1 kapsułka na noc przez 1 tydzień.

W razie potrzeby leczenie należy powtórzyć, po skonsultowaniu się z lekarzem.

SPOSÓB STOSOWANIA: kapsułkę należy umieścić głęboko w pochwie zachowując zasady higieny osobistej.

Przeciwwskazania

uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności:

należy zachować szczególną ostrożność u pacjentek z ciężkim zaburzeniem układu immunologicznego.

Dodatkowe

W wielośrodowym, randomizowanym badaniu klinicznym, kontrolowanym placebo, z udziałem dorosłych kobiet, nie obserwowano ciężkich działań niepożądanych po stosowaniu INVAG®. Nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy w częstości występowania zdarzeń niepożądanych pomiędzy grupą stosującą INVAG® a grupą stosującą placebo. W obu grupach stwierdzono zdarzenia niepożądane o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, ale związek z zastosowaniem produktu najczęściej oceniano jako mało prawdopodobny lub prawdopodobny. Działania występujące często (1/100 do <1/10): upławy, świąd, pieczenie, ból w podbrzuszu, palenie, obrzęk i zaczerwienienie warg sromowych, erytroplakia, częstomocz, parcie na mocz, przeziębienie, ból głowy.

