

## Kerato Vita maść do oczu 1 tub.a 5g

Cena: 31,08 PLN



### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 tub.a 5g
Postać	maść do oczu
Producent	PHARM SUPPLY SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

### Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: wyrób medyczny

PRODUCENT: PHARM SUPPLY

ILOŚĆ: 5 g

Maść do oczu z witaminą A i D-pantenolem, nie zawiera środków konserwujących

#### DZIAŁANIE:

Kerato Vita® długotrwale łagodzi objawy suchości, podrażnienia lub łagodnego podrażnienia, których przyczyną może być zwłaszcza: otoczenie, np. klimatyzacja, wiatr lub zanieczyszczenie powietrza spowodowane np. dymem papierosowym zmęczenie oka spowodowane długotrwałym patrzeniem, np. w ekran monitora, przez mikroskop czy w czasie długiej jazdy samochodem obciążenie mechaniczne, np. spowodowane używaniem twardych lub miękkich soczewek kontaktowych lub wykonaniem zabiegów diagnostycznych oka.

#### WSKAZANIA:

Kerato Vita® stosuje się w celu długotrwałej poprawy jakości filmu łzowego oraz intensywnej ochrony powierzchni oka. Chroniące komórki właściwości preparatu umożliwiają normalną, ponowną epitelializację w przypadku zaburzeń spowodowanych suchością.

#### DAWKOWANIE:

W celu długotrwałej poprawy jakości filmu łzowego oraz intensywnej ochrony powierzchni oka preparat Kerato Vita® zwykle stosuje się 3 razy dziennie. Dla uzyskania intensywnego i długotrwałego efektu przy podrażnionych oczach szczególnie zalecane jest stosowanie preparatu przed udaniem się na nocny spoczynek.

Należy zdjąć nakrętkę z tubki, odchylić głowę lekko do tyłu, odciągnąć delikatnie dolną powiekę i ściskając ostrożnie tubkę, umieścić w worku spojówkowym pasek preparatu o długości ok. 0,5 cm, powoli zamknąć oko, a następnie ostrożnie zamknąć tubę.

Preparat należy stosować nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 30 dni.

**SKŁAD:**

Witamina A, witamina E, D-pantenol, wazelina, parafina ciekła, lanolina, alkohol cetostearylowy, woda oczyszczona

**OSTRZEŻENIA:**

Po zastosowaniu preparat może przejściowo powodować niewyraźne widzenie. W tym okresie nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do momentu odzyskania normalnej ostrości widzenia.

Preparatu nie należy stosować w przypadku:  
nadwrażliwości na którykolwiek ze składników  
stanu zapalnego oka.

Jeżeli podrażnienie utrzyma się, należy skonsultować się z lekarzem.

Preparat Kerato VitA® nie powinien być stosowany jednocześnie z używaniem soczewek kontaktowych.

W przypadku stosowania preparatu Kerato VitA® z innymi lekami okulistycznymi, należy zachować ok. 30-minutową przerwę pomiędzy podaniem preparatu Kerato VitA® i innych leków okulistycznych. Preparat Kerato VitA® powinien być zawsze stosowany jako ostatni.

Należy unikać dotykania końcówką tubki zarówno oka, jak i skóry twarzy, aby zapobiec zakażeniom lub urazom oka. Należy unikać zginania lub skręcania tubki, aby nie doprowadzić do jej uszkodzenia.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.