


## Kerdex 25mg 30 tabl.



Cena: 24,41 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	0,025 g
Opakowanie	30 tabl.
Postać	tabl.powl.
Producent	ADAMED PHARMA S.A.
Rejestracja	
Substancja czynna	Dexketoprofenum

### Opis produktu

#### **Kerdex** (25 mg deksketoprofen, tabletki)

**lek przeciwbólowy** wskazany w objawowym leczeniu bólu o nasileniu ?agodnym do umiarkowanego, np. bólu:

- w uk?adzie mi??niowym i kostno-stawowym,
- bolesnego miesi?czkowania,
- bólu z?bów.

**Nazwa produktu leczniczego i nazwa powszechnie stosowana:** Kerdex (dexketoprofenum).

**Dawka substancji czynnej:** 1 tabletki powlekana zawiera 36,90 mg deksketoprofenu z trometamolem, co odpowiada 25 mg deksketoprofenu.

**Postać farmaceutyczna:** tabletki powlekane.

**Wskazania do stosowania:** objawowe leczenie bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, np. bólu w układzie mięśniowym i kostro-stawowym, bolesnego miesiączkowania, bólu zębów.

**Przeciwwskazania:** u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną, inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; u pacjentów, u których substancje o podobnym mechanizmie działania (np. kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ) wywołują napad astmy, skurcz oskrzeli, ostry nieżyt błonicy nosowej lub powodują wystąpienie polipów nosa, pokrzywki lub obrzęku naczynioruchowego; u pacjentów z reakcjami fotoalergicznymi lub fototoksycznymi podczas stosowania ketoprofenu lub fibratów w wywiadzie; u pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforację, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ; u pacjentów z czynną chorobą wrzodową, owrzodką lub krwawieniem z przewodu pokarmowego bądź ich podejrzeniem, jak również wywiadem krwawienia z przewodu pokarmowego lub perforacji; u pacjentów z przewlekłą niestrawnością; u pacjentów, u których występuje inne czynne krwawienie z przewodu pokarmowego lub zaburzenia przebiegające z krwawieniami; u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego; u pacjentów z ciężką niewydolnością serca; u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <59 ml/min); u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (10-15 punktów w skali Child'a – Pugh'a); u pacjentów ze skazą krwotoczną i innymi zaburzeniami krzepnięcia krwi; u pacjentów ciężko odwodnionych (z powodu wymiotów, biegunki lub przyjmowania niedostatecznej ilości płynów); u kobiet w trzecim trymestrze ciąży i w okresie laktacji.

**Opakowanie:** Blistry PVC/PVDC /Aluminium umieszczone w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 10, 20, 30, 40, 50 tabletek powlekanych. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

**Podmiot odpowiedzialny:** Adamed Pharma S.A., ul. Mariana Adamkiewicza 6a, 05-152 Czosnów, Polska. Tel.: +48227518517, fax.: +48227518467, e-mail: adamed@adamed.com