

Magne B6 48mg +5mg 60 tabl.

Cena: 15,98 PLN



Opis słownikowy

Dawka	0,048g Mg ²⁺ +5mg
Opakowanie	60 tabl. (3 blist.po 20 szt.)
Postać	tabl.powl.
Producent	SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Magnesium lactate, Pyridoxini hydrochloridum

Opis produktu

Magne B6 48mg +5mg 60 tabl.

Magnez to niezbędny do prawidłowego przebiegu wielu biochemicznych procesów w ustroju kation. Jego biologicznym zadaniem jest aktywacja szeregu enzymów. Ma wpływ na stan pobudliwości nerwowo-mięśniowej i odgrywa ważną rolę w procesie skurczu mięśnia sercowego. Magnez wchłaniany jest jedynie częściowo z przewodu pokarmowego, głównie w jelicie cienkim, a wielkość jego wchłaniania zależy od zawartości magnezu w pokarmach. Niedobór magnezu może doprowadzić do zaburzeń w ośrodkowym układzie nerwowym oraz w układzie mięśniowym. Przyjmowanie witaminy B6 wraz z magnezem zwiększa jego wchłanianie z przewodu pokarmowego o 20 do 40%.

Wskazania

Uzupełnienie niedoborów magnezu i/lub witaminy B6 w organizmie, mogące objawiać się:

nerwowością, drażliwością, wahaniami nastroju, łagodnym lękiem, niepokojem, przejściowy uczuciem zmęczenia i ospałością, zaburzeniami snu w niewielkim nasileniu, kurczami mięśni, mrowieniem, drganiem powiek.

Uzupełnienie poziomu magnezu może złagodzić powyższe objawy, Lek jest przeznaczony dla osób dorosłych i dzieci w wieku 6 lat lub powyżej.

Skład

1 tabletkę powlekaną zawiera:

substancje czynne: jony magnezu (w postaci magnezu mleczanu dwuwodnego) 48 mg Mg²⁺ (1,97 mmol), pirydoksyny chlorowodorek (witamina B6) 5 mg,

substancje pomocnicze: sacharoza, kaolin ciężki, guma arabska, karboksypolimetylen 934, talk, magnezu stearynian, skład otoczkowy: guma arabska, sacharoza, tytanu dwutlenek, talk, wosk Carnauba.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub zgodnie z zaleceniami lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy poradzić się lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Dorośli: stosować 6-8 tabletek powlekanych na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych.

Dzieci w wieku 6 lat (o masie ciała około 20 kg) lub starsze: stosować 4-6 tabletek powlekanych na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych.

Lek należy przyjmować w trakcie posiłku, popijając wodą.

W przypadku braku poprawy po miesiącu stosowania produktu leczniczego Magne B6® kontynuowanie leczenia nie jest zalecane.

Działania niepożądane

Lek ten, jak każdy inny lek, może powodować działania niepożądane, co nie oznacza, że u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

nadwrażliwość, ból brzucha, biegunka, reakcje skórne, w tym: świąd, pokrzywka, wyprysk, rumień.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek ze względu na ryzyko wystąpienia wysokiego poziomu magnezu we krwi.

W przypadku przyjmowania wysokich dawek leku przez długi okres czasu u pacjenta mogą wystąpić problemy związane z uszkodzeniem nerwów czuciowych.

Dzieci i młodzież

Lek należy stosować wyłącznie dorosłych oraz dzieci w wieku 6 lat i starszych. Dla dzieci w wieku poniżej 6 lat dostępne są inne postaci leku.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, bądź podejrzewa, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, przed zastosowaniem tego leku, powinna skonsultować się z lekarzem.

Lek Magne B6® może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie po konsultacji z lekarzem.

Doświadczenia kliniczne nie ujawniły szkodliwego działania magnezu.

W okresie karmienia piersią decyzję o stosowaniu leku podejmuje lekarz, który określa również zalecaną dawkę leku.

Magne B6® może być stosowany u kobiet karmiących piersią przy zachowaniu terapeutycznych dawek. Zaleca się, aby kobiety w okresie karmienia piersią stosowały witaminę B6 w dawce nie większej niż 20 mg na dobę.

Badania nad witaminą B6 wykazują wpływ na płodność mężczyzn. Jednakże taki efekt obserwuje się tylko przy bardzo wysokich dawkach. Bezpieczeństwo stosowania leku Magne B6® jest bardzo wysokie ze względu na niską zawartość witaminy B6.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Magne B6[®] zawiera sacharozę.

Jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent przed przyjęciem leku, powinni poradzić się lekarza.