

# Magne B6 Forte 100mg+10mg 100 tabl.



Cena: 47,77 PLN

## Opis słownikowy

Dawka	0,1g+0,01g
Opakowanie	100 tabl.
Postać	tabl.powl.
Producent	SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Magnezium, Pyridoxinum

## Opis produktu

Magne B6 Forte zawiera jony magnezowe oraz chlorowodoru pirydoksyny (witaminę B6).

### DZIAŁANIE:

W niedoborach magnezu, którym towarzyszy nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, łagodny lęk, niepokój, przejściowe uczucie zmęczenia, ospałość, zaburzenia snu w niewielkim nasileniu. Zalecany w objawach lęku, takich jak skurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie serca (bez zaburzeń serca), a także w skurczach mięśni, mrowieniu, drganiu powiek.

### Wskazania

Uzupełnienie niedoborów magnezu i/lub witaminy B6 w organizmie, mogące objawiać się:

nerwowością, drażliwością, wahaniami nastroju, łagodnym lękiem, niepokojem, przejściowym uczuciem zmęczenia i ospałością, zaburzeniami snu w niewielkim nasileniu, kurczami mięśni, mrowieniem, drganiem powiek.

Uzupełnienie poziomu magnezu może złagodzić powyższe objawy, Lek jest przeznaczony dla osób dorosłych i dzieci w wieku 6 lat lub powyżej.

### Skład

#### 1 tabletkę powlekaną zawiera:

substancje czynne: jony magnezu (w postaci magnezu mleczanu dwuwodnego) 48 mg Mg<sup>2+</sup> (1,97 mmol), pirydoksyny chlorowoderek

(witamina B6) 5 mg,  
substancje pomocnicze: sacharoza, kaolin ciężki, guma arabska, karboksypolimetylen 934, talk, magnezu stearynian,  
skład otoczki: guma arabska, sacharoza, tytanu dwutlenek, talk, wosk Carnauba.

## Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub zgodnie z zaleceniami lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy poradzić się lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Dorośli: stosować 6-8 tabletek powlekanych na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych.  
Dzieci w wieku 6 lat (o masie ciała około 20 kg) lub starsze: stosować 4-6 tabletek powlekanych na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych.  
Lek należy przyjmować w trakcie posiłku, popijając wodą.

W przypadku braku poprawy po miesiącu stosowania produktu leczniczego Magne B6® kontynuowanie leczenia nie jest zalecane.

## Działania niepożądane

Lek ten, jak każdy inny lek, może powodować działania niepożądane, co nie oznacza, że u każdego one wystąpią.  
Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

nadwrażliwość, ból brzucha, biegunka, reakcje skórne, w tym: świąd, pokrzywka, wyprysk, rumień.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek ze względu na ryzyko wystąpienia wysokiego poziomu magnezu we krwi.

W przypadku przyjmowania wysokich dawek leku przez długi okres czasu u pacjenta mogą wystąpić problemy związane z uszkodzeniem nerwów czuciowych.

### Dzieci i młodzież

Lek należy stosować wyłącznie dorosłych oraz dzieci w wieku 6 lat i starszych. Dla dzieci w wieku poniżej 6 lat dostępne są inne postaci leku.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

### Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, bądź podejrzewa, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, przed zastosowaniem tego leku, powinna skonsultować się z lekarzem.

Lek Magne B6® może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie po konsultacji z lekarzem.

Doświadczenia kliniczne nie ujawniły szkodliwego działania magnezu.

W okresie karmienia piersią decyzję o stosowaniu leku podejmuje lekarz, który określa również zalecaną dawkę leku.

Magne B6® może być stosowany u kobiet karmiących piersią przy zachowaniu terapeutycznych dawek. Zaleca się, aby kobiety w okresie karmienia piersią stosowały witaminę B6 w dawce nie większej niż 20 mg na dobę.

Badania nad witaminą B6 wykazują wpływ na płodność mężczyzn. Jednakże taki efekt obserwuje się tylko przy bardzo wysokich dawkach. Bezpieczeństwo stosowania leku Magne B6® jest bardzo wysokie ze względu na niską zawartość witaminy B6.

### Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Magne B6<sup>®</sup> zawiera sacharozę.

Jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent przed przyjęciem leku, powinni poradzić się lekarza.