

Maxicortan krem 0,01 g/g 15 g

Cena: 15,22 PLN



Opis słownikowy

Dawka	0,01 g/g
Opakowanie	15 g
Postać	krem
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Hydrocortisonum

Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: AFLOFARM

ILOŚĆ: 15 g

OPIS:

Maxicort to lek w postaci kremu, który łagodzi stany zapalne skóry – przede wszystkim o podłożu alergicznym.

DZIAŁANIE:

Lek zawiera w swym składzie octan hydrokortyzonu. Jest to syntetyczny kortykosteroid o słabym działaniu przeciwzapalnym. Stosowany miejscowo działa przeciwzapalnie, przeciwświądowo i obkurczająco na naczynia krwionośne. Octan hydrokortyzonu po podaniu na skórę łatwo przenika do warstwy rogowej skóry. W niewielkim stopniu może przenikać do układu krążenia i wykazuje wówczas działanie ogólne. Po wchłonięciu kortyzon jest metabolizowany głównie w wątrobie.

WSKAZANIA:

Maxicortan stosuje się do miejscowego leczenia atopowego zapalenia skóry, wyprysku kontaktowego alergicznego, pokrzywki, reakcji występujących po użądleniu lub ukąszeniu przez owady (jak swędzenie i podrażnienie).

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Lek przeznaczony do podania miejscowego na skórę. Nakładaj niewielką ilość kremu na miejsce zmienione chorobowo 1 lub 2 razy na dobę. Nie należy stosować produktu leczniczego na duże powierzchnie skóry bez zalecenia lekarza. Nie stosować dłużej niż 7 dni bez zalecenia lekarza.

SKŁAD:

1 g kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu octanu. Substancje pomocnicze: alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, glikolol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, makrogolu eter cetostearylowy, parafina ciekła, sorbitanu stearynian, wazelina biała, woda oczyszczona.

OSTRZEŻENIA:

Przed rozpoczęciem stosowania leku Maxicortan, należy to omówić z lekarzem lub farmaceutą.

Nie stosować leku Maxicortan, jeśli pacjent ma uczulenie na hydrokortyzonu octan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; jeśli u pacjenta występuje zakażenie bakteryjne, wirusowe lub grzybicze; jeśli pacjent ma trądzik zwykły lub trądzik różowaty; jeśli u pacjenta występuje atrofia (zanik) skóry; jeśli pacjent ma nowotwór skóry lub stan przednowotworowy skóry; jeśli u pacjenta występuje zapalenie skóry okolicy ust; jeśli u pacjenta występują zmiany grucznicze skóry; jeśli pacjent ma otwarte rany i uszkodzoną skórę; na skórę twarzy.

Nie należy stosować leku na zdrową skórę.

Nie należy stosować dużych dawek leku, na dużą powierzchnię skóry oraz przez długi czas, ponieważ kortykosteroidy wchłaniają się do krwi i mogą spowodować wystąpienie objawów niepożądanych.

Jeśli w miejscu stosowania leku Maxicortan wystąpi zakażenie skóry, należy skontaktować się z lekarzem.

Unikać kontaktu leku z oczami oraz błonami śluzowymi. Jeśli lek dostanie się do oczu, nosa należy natychmiast przemyć je wodą.

Lek może być stosowany na skórę pach i pachwin tylko w przypadkach bezwzględnie koniecznych, ponieważ lek szybciej się wchłania w tych miejscach i istnieje ryzyko nasilenia działań niepożądanych.

Lek Maxicortan nie powinien być stosowany pod opatrunki.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu: 28 dni.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.