

MELILAX PEDIATRIC Mikrowlewka dla dzieci 6



DLA NIEMOWLĄT I DZIECI

Cena: 38,49 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	6 mikrowl.
Postać	-
Producent	ABOCA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Melilax, Mikrowlewka doodbytnicza z Promelaxin

DZIAŁANIE:

Melilax ma działanie wypróżniające, które zapewnia bodziec aktywujący defekację.

WSKAZANIA:

Melilax Pediatric przeznaczony jest do leczenia zaparć u dzieci i u niemowląt, również w przypadku nadwrażliwości trzewnej (jak w przypadku jelita nadwrażliwego), szczelin odbytu i hemoroidów.

Produkt oczyszcza jelito i wykazuje działanie ochronne, dzięki czemu zmniejsza dolegliwości, podrażnienia i stan zapalny obecne w czasie zaparcia.

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Niemowleta od 0 do 1 roku życia: pół mikrowlewki Melilax pediatric 5 g w razie potrzeby.

Dzieci od 1 do 3 lat: 1 mikrowlewka Melilax pediatric 5 g w razie potrzeby.

Dzieci od 3 do 12 lat: 1 mikrowlewka Melilax pediatric 5 g w razie potrzeby. W przypadku uporczywych zaparć stosować 2 dawki jednocześnie

SKŁAD:

Substancje czynne 73,2%

Promelaxin, kompleks miodów i polisacharydów z aloesu prawdziwego i ślazu dzikiego. Mianowany na: monosacharydy \geq 50%,

polisacharydy (ciężar molekularny > 20 000 Dalton) \geq 0,3%.
Zawiera ponadto: mieszanę wodno-glicerynową, sok z cytryny, olejek eteryczny z lawendy.

OSTRZEŻENIA:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub alergii na jeden lub więcej składników. W przypadku długotrwałych zaparć należy skonsultować się z lekarzem w celu wykluczenia innych schorzeń.
Mikrowlewka jest jednorazowego użytku, dlatego nie może być ponownie stosowana, gdy zużyje się tylko połowę dawki, jak w przypadku niemowląt.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub alergii na jeden lub więcej składników.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła i światła.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Po otwarciu produkt należy zużyć w ciągu 3 miesięcy.
Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.