MIG dla dzieci 40mg/ml 100ml

Cena: 18,61 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,04 g/ml
Opakowanie	100 ml (butelka)
Postać	zaw.doust.
Producent	BERLIN CHEMIE AG
Rejestracja	
Substancja czynna	Ibuprofenum

Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: lek

PRODUCENT: BERLIN CHEMIE

ILOŚĆ: 100 ml

OPIS:

MIG Forte – zawiesina dla dzieci (40 mg/ml) o smaku truskawkowym.

DZIAŁANIE:

MIG Forte jest lekiem przeciwzapalnym i przeciwbólowym (niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym, NLPZ) wykazującym działanie przeciwgorączkowe.

WSKAZANIA:

Zalecany jest przy krótkotrwałym leczeniu objawowym: gorączka różnego pochodzenia (także w przebiegu zakażeń wirusowych, w przebiegu odczynu poszczepiennego, bólu o łagodnym i umiarkowanym nasileniu, bóle różnego pochodzenia: bóle głowy, gardła i mięśni

np. w przebiegu zakażeń wirusowych, bóle mięśni, stawów i kości, na skutek urazów narządu ruchu (nadwyrężenia, skręcenia), bóle na skutek urazów tkanek miękkich, bóle pooperacyjne, bóle zębów, bóle po ekstrakcji zębów, bóle na skutek ząbkowania, bóle głowy, bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego.

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Masa cia?a (wiek)	Dawka jednorazowa	Ca?kowita dawka dob
10-15 kg (dzieci w wieku 1 rok do 3 lat)	100 mg ibuprofenu (co odpowiada 2,5 ml zawiesiny)	300 mg ibuprofenu (co odpowiada 7,5 ml
16-19 kg (dzieci 4 do 5 lat)	150 mg ibuprofenu (co odpowiada 3,75 ml zawiesiny)	450 mg ibuprofenu (co odpowiada 11,25 zawiesiny)
20-29 kg (dzieci 6 do 9 lat)	200 mg ibuprofenu (co odpowiada 5 ml zawiesiny)	600 mg ibuprofenu (co odpowiada 15 ml
30-39 kg (dzieci 10 do 11 lat)	200 mg ibuprofenu (co odpowiada 5 ml zawiesiny)	600 mg ibuprofenu (co odpowiada 15 ml
? 40 kg (m?odzie? od 12 lat i doro?li)	200-400 mg ibuprofenu (co odpowiada 5-10 ml zawiesiny)	1200 mg ibuprofenu (co odpowiada 30 ml

SKŁAD:

1ml zawiesiny zawiera: substancję czynną: 40mg ibuprofenu oraz substancje pomocnicze: benzoesan sodu (E211), bezwodny kwas cytrynowy, cytrynian sodu, sacharyna sodowa, chlorek sodu, hypromeloza 15cP, guma ksantanowa, maltitol ciekły, glicerol (E422), taumatyna (E957), aromat truskawkowy (naturalne preparaty smakowe, maltodekstryna, cytrynian trietylu (E1505), glikol propylenowy (E1520) i alkohol benzylowy), woda oczyszczona.

OSTRZEŻENIA:

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych; jeśli w wywiadzie występował skurcz oskrzeli, astma, nieżyt nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), w niespecyficznych zaburzeniach krwiotworzenia, w czynnej lub nawracającej chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy lub krwotokach z przewodu pokarmowego, jeśli w wywiadzie występowały krwawienia z przewodu pokarmowego lub perforacja w następstwie przyjmowania NLPZ, w przypadku krwawień z naczyń mózgowych lub innych czynnych krwawień, w ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek w chorobie niedokrwiennej serca, w ciężkiej niewydolności serca; w ciężkim odwodnieniu (spowodowanym wymiotami, biegunką lub przyjmowaniem niedostatecznej ilości płynów), u kobiet w trzecim trymestrze ciąży.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.