

Neo-Pancreatinum Forte 10000j 20 kaps

Cena: 20,95 PLN



Opis słownikowy

Dawka	10 000 j. Ph.Eur.
Opakowanie	20 kaps. (pojemnik)
Postać	kaps.dojel.
Producent	PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Pancreatinum

Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: lek
PRODUCENT: JELFA
ILOŚĆ: 20 kapsulek

NEO-PANCREATINUM FORTE 10 000 j. 20 kapsulek

DZIAŁANIE:

Zawiera trzy leki: proteazę, amylazę, lipazę. Białka pomagają przetwarzać i strawić jedzenie.

WSKAZANIA:

Preparat stosowany jest w stanach niedoboru enzymów trzustkowych o różnej przyczynie, jak: przewlekłe zapalenie trzustki, mukowiscydoza, niedrożność przewodów trzustkowych lub żółciowych spowodowana przez nowotwór, stan po usunięciu trzustki lub jej części, stan po usunięciu żołądka.

DAWKOWANIE:

Doustnie, popijając wodą lub innymi niekwaśnymi płynami. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. Kapsułki należy połykać w całości, nie należy ich rozgryzać, kruszyć ani trzymać w jamie ustnej, gdyż może to powodować podrażnienie błony śluzowej, a także zmniejszyć skuteczność preparatu. W przypadku niemożności połknięcia lub w przypadku konieczności podania mniejszej ilości enzymu kapsułkę można otworzyć, a wysypane peletki podać po zmieszaniu z małą ilością pokarmu a następnie popić szklanką wody lub np. soku owocowego (nie dodawać do mleka i mieszanek mlecznych). Należy unikać podawania leku z pokarmem o pH wyższym niż 5,5 (odczyn zasadowy). W warunkach tych istnieje możliwość wcześniejszego (zanim lek dotrze do dwunastnicy) uwolnienia substancji czynnych z kapsulek, co może prowadzić do unieczynnienia enzymów w świetle żołądka.

SKŁAD:

1 kapsułka zawiera pankreatynę o następującej aktywności enzymatycznej: 10 000 j.Ph.Eur. lipazy, 8000 j.Ph.Eur. amylazy, 500 j.Ph.Eur. proteaz.

OSTRZEŻENIA:

Podczas jego stosowania mogą wystąpić objawy nadwrażliwości na białko wieprzowe lub inne składniki. Objawy alergii na lek mogą być następujące: wysypka, kichanie, łzawienie. W przypadku stosowania dużych dawek preparatu (znacznie przekraczających zalecane) rejestrowano: biegunkę, nudności, wymioty, podwyższenie stężenia kwasu moczowego w surowicy i moczu, kamicę moczową. Preparat hamuje wchłanianie kwasu foliowego i soli żelaza. Pankreatyna może powodować podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej i okolicy odbytu, zwłaszcza u dzieci. Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na sprawność psychomotoryczną, zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.