Niquitin 3; 36mg; 7mg/24h 7 plastrów przezroczystych



Cena: 93,93 PLN

Opis słownikowy

Dawka	7 mg/24h (36 mg)
Opakowanie	7 szt.
Postać	syst.transderm.,plast.
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Substancja czynna	Nicotinum

Opis produktu

NiQuitin 7mg/24h,

7 plastrów przezroczystych zawierających nikotynę

DZIAŁANIE:

Przynosi szybką ulgę w razie nagłego napadu głodu nikotynowego.

WSKAZANIA:

Do łagodzenie objawów wynikających z odstawienia nikotyny, w tym uczucia głodu nikotynowego, związanych z rzucaniem palenia tytoniu.

DAWKOWANIE:

Plaster należy stosować raz na dobę. Jeśli w ciągu dnia wypalasz więcej niż 10 papierosów, kurację zacznij od plastra o dawce 21mg (stopień 1). Jeśli w ciągu dnia wypalasz 10 lub mniej papierosów, kurację zacznij od plastra o dawce 14mg (stopień 2).

Kuracja NiQuitin trwa 10 lub 8 tygodni w zależności od jakiego stopnia plastrów rozpocząłeś kurację:

- jeśli zacząłeś z plastrami 21 mg (stopień 1) - stosuj je przez 6 tygodni. Następnie zmniejsz dawkę plastra na 14 mg (Stopień 2), które stosuj przez następne 2 tygodnie. Ostatni Stopień 3 to plastry 7 mg - stosuj je również przez 2 tygodnie.

- jeżeli zacząłeś od Stopnia 2 (plastry 14mg) stosuj je przez 6 tygodni. Później przejdź do Stopnia 3 (plastry 7 mg), które będziesz używać przez następne 2 tygodnie.

SKŁAD:

substancje czynne: nikotyna 114mg oraz substancje pomocnicze: kopolimer etylenowinylooctanu, polietylenu tereftalen/etylenowinylooctan, wysokiej gęstości film polietylenowy, lapki kaminat poliizobutylenowy, film poliestrowy, biały atrament.

OSTRZEŻENIA:

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.