


# Nizoral szampon 20 mg/1g 100 ml



Cena: 44,86 PLN

## Opis słownikowy

Dawka	0,02 g/g
Opakowanie	100 ml (butelka)
Postać	szamp.leczn.
Producent	MCNEIL PRODUCTS LIMITED C/O JOHNSON & JOHNSON LTD
Rejestracja	
Substancja czynna	Ketoconazolum

## Opis produktu

**Lek Nizoral**, szampon leczniczy jest wskazany w leczeniu i profilaktyce następujących chorób skóry wywołanych przez drożdżaki z rodzaju *Malassezia*.

### DZIAŁANIE:

Nizoral w postaci szamponu leczniczego jest lekiem przeciwgrzybiczym do stosowania miejscowego na skórę. Lek zawiera substancję czynną ketokonazol.

### WSKAZANIA:

- łupież owłosionej skóry głowy,
- łojotokowe zapalenie skóry,
- łupież pstry wywołany przez *Pityriasis versicolor*

### DAWKOWANIE:

O ile lekarz nie zaleci inaczej, Nizoral szampon leczniczy, zwykle stosuje się jak opisano poniżej:

nanieść niewielką ilość szamponu na zakażoną skórę.

używając niewielkiej ilości wody rozprowadzić szampon równomiernie na skórze. W przypadku długich włosów wystarczy umyć jedynie skórę głowy.

wcierać szampon w skórę, aż do uzyskania piany.

pozostawić na skórze przez 3 do 5 minut, a następnie spłukać.

na co dzień można używać zwykłego szamponu.

- łupież pstry - stosować raz na dobę przez 5 kolejnych dni.
- łojotokowe zapalenie skóry i łupież skóry głowy - stosować dwa razy w tygodniu przez 2 do 4 tygodni.

#### SKŁAD:

1 g szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Inne składniki to: sól sodowa eteru monolaurylosulfonobursztynowego, sól disodowa eteru laurylosulfonowego, dietanolamid kwasu tłuszczowego oleju kokosowego, laurdimonium, makrogolu 120 metyloglukozodioleinian, kompozycja zapachowa, sodu chlorek, imidomocznik, sodu wodorotlenek, kwas solny stężony, erytrozyna sodowa, woda oczyszczona.

#### OSTRZEŻENIA:

Mogą wystąpić reakcje miejscowe, jak pieczenie, swędzenie, podrażnienie, a także objawy przetłuszczania bądź wysuszania włosów.

W rzadkich przypadkach głównie u pacjentów z chemicznie zniszczonymi lub z siwymi włosami było obserwowane odbarwienie włosów.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10000 pacjentów stosujących lek) występowały reakcje nadwrażliwości, łysienie, wysypka, pokrzywka, podrażnienie skóry, suchość skóry, odczyny w miejscu podania.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.