

# Olimp Menopauzin Forte 30 tabl.

Cena: 22,45 PLN



## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	30 tabl.
Postać	tabl.powl.
Producent	OLIMP LABORATORIES
Substancja czynna	-

## Opis produktu

Menopauzin FORTE - 30 tabletek

### ZASTOSOWANIE:

Dla kobiet w okresie menopauzy.

### ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

1 tabletkę dziennie, po posiłku, popijając dużą ilością wody.

Uwaga: Nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży, karmiących piersią lub w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. W okresie stosowania preparatu nie należy stosować leków nasennych, uspokajających lub przeciwłękowych. Nie stosować produktu dłużej niż przez 6 miesięcy bez konsultacji z lekarzem. W przypadku występowania ciężkich chorób spożycie produktu skonsultować z lekarzem.

### SKŁAD:

Informacja żywieniowa 1 tabletkę RWS\*  
Ekstrakt izoflawonów sojowych (80%) 75 mg  
w tym: izoflawony sojowe 60 mg  
Ekstrakt z szyszek chmielu (*Humulus lupulus L.*) 50 mg  
Ekstrakt Ashwagandhy KSM-66, 50 mg  
(*Withania somnifera L.*),  
w tym witanolidy (5%) 2,5 mg  
Wapń 400 mg 50%\*  
Witamina D 10 µg 200%\*  
Witamina E (mg α-TE) 12 mg 100%\*

Witamina B6 1,4 mg 100%\*  
Kwas foliowy 400 µg 200%\*

\*RWS – referencyjna wartość spożycia.

Składniki: węglan wapnia – wapń, substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna; ekstrakt izoflawonów sojowych, ekstrakt z szyszek chmielu zwyczajnego (*Humulus lupulus* L.), ekstrakt Ashwagandhy KSM-66 (*Withania somnifera* L.), substancje glazurujące – alkohol poliwinylowy (PVA), glikol polietylenowy, talk, krzemian glinowo-potasowy, monooleinian polioksyetylenosorbitolu; octan DL-alfa-tokoferylu – witamina E, substancja wypełniająca – sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; substancja przeciwzbrylająca – dwutlenek krzemu; substancja wiążąca – fosforany wapnia; substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych; cholekalcyferol – wit. D, chlorowoderek pirydoksyny – wit. B6, kwas pteroilomonoglutaminowy – folian, barwnik – dwutlenek tytanu.

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu  
Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.