


OLIMP ZatoClear Med Irygacja Zestaw uzupeł



Cena: 24,70 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	15 sasz.
Postać	-
Producent	OLIMP LABORATORIES
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety
 PRODUCENT: OLIMP LABORATORIES
 ILOŚĆ: 15 saszetek

ZATOCLEAR MED UZUPEŁNIENIE 15 SASZETEK

ZASTOSOWANIE:

Wyrób medyczny ZatoClear Med. Irygacja jest pomocny w szczególnie w przypadku ostrych i przewlekłych stanów zapalnych zatok przynosowych, alergicznego lub infekcyjnego nieżytu nosa, przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok, w okresie zwiększonej ekspozycji na pyły zawieszone w powietrzu (smog) lub miejscu pracy, a także w celu utrzymania prawidłowej higieny nosa i zatok przynosowych.

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Płukanie należy przeprowadzać 1-2 razy dziennie lub według zaleceń lekarza.

Irygacje należy wykonać za pomocą specjalnej butelki dołączonej do zestawu startowego ZatoClear Med Irygacja.

Przed pierwszym użyciem opłucz wszystkie elementy butelki ciepłą wodą. Umyj i osusz ręce.

Wsymp do butelki zawartość jednej saszetki ZatoClear Med Irygacja i uzupełnij przegotowaną wodą (o temperaturze ciała) do poziomu zaznaczonej linii.

Dokładnie zakręć butelkę, zakryj palcem otwór w nakrętce i kilkakrotnie wstrząśnij butelką do całkowitego rozpuszczenia substancji.

Stań nad umywalką w lekko pochylonej pozycji. Przyłóż końcówkę butelki do jednego z otworów nosowych. Płynnym ruchem ściśnij

butelkę tak, by roztwór dostał się do jamy nosowej. Przez cały czas irygacji spokojnie oddychaj przez usta. Roztwór wypłynie drugim otworem nosowym.

Powtórz czynność dla pozostałej części roztworu, przykładając butelkę do drugiego otworu nosowego.

Po zakończeniu irygacji delikatnie wydmuchaj nos. Pozostała, niewykorzystana część roztworu wylej. Wszystkie elementy butelki opłucz i osusz przed odłożeniem do przechowywania.

SKŁAD:

Ksylitol, chlorek sodu Ph.Eur.

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu
Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.