

Orofar MAX 2 mg + 1 mg 20 pastylek

Cena: 23,10 PLN



Opis słownikowy

Dawka	2mg+1mg
Opakowanie	20 pastyl.
Postać	pastyl.twarde
Producent	NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH
Rejestracja	
Substancja czynna	Cetylopyridinii chloridum, Lidocainum hyd

Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: NOVARTIS

ILOŚĆ: 20 pastylek

OPIS:

Orofar Max to lek stosowany w miejscowym leczeniu antyseptycznym stanów zapalnych gardła i jamy ustnej, a także w łagodzeniu dolegliwości bólowych w tych stanach.

DZIAŁANIE:

Lek zawiera substancję antyseptyczną działającą przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo i przeciwwirusowo w obrębie jamy ustnej i gardła oraz substancję o miejscowym działaniu znieczulającym, która łagodzi ból i podrażnienia. Połączenie chlorku cetylopyridyniowego oraz olejków miętowych i lewomentolu zapewnia tabletkom Orofar Max dodatkowo właściwości chłodzące i odświeżające, szczególnie cenne w przypadku leków do stosowania miejscowego w jamie ustnej.

WSKAZANIA:

Miejscowe leczenie antyseptyczne stanów zapalnych gardła i jamy ustnej, a także łagodzenie dolegliwości bólowych w tych stanach. Orofar Max jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat – 1 tabletkę co 1 do 3 godzin w zależności od nasilenia bólu. Nie należy przekraczać 6 pastylek w ciągu doby.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat – 1 pastylka co 3 do 4 godzin w zależności od nasilenia bólu. Nie należy przekraczać 3 pastylek w ciągu doby.

SKŁAD:

Substancjami czynnymi leku są cetylopirydyniowy chlorek i lidokainy chlorowodorek. Jedna pastylka Orofar Max zawiera 2 mg cetylopirydyniowego chlorku i 1 mg lidokainy chlorowodoru. Pozostałe składniki leku to: olejek miętowy z liści mięty pieprzowej, olejek miętowy Schimmela, lewo-mentol, acesulfam potasowy, skrobia kukurydziana, kwas cytrynowy jednowodny, makrogol 6000, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, sorbitol.

OSTRZEŻENIA:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne, inne środki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Należy unikać jednoczesnego spożywania alkoholu, ponieważ zwiększa on wchłanianie chlorku cetylopirydyniowego, co może prowadzić do przedawkowania.

Lek zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.