

# Otrivin Katar i Zatoki aerozol do nosa



Cena: 30,61 PLN

## Opis słownikowy

Dawka	1 mg/ml
Opakowanie	1 but.a 10ml
Postać	aer.do nosa, roztwór
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Xylometazolini hydrochloridum

## Opis produktu

**RODZAJ REJESTRACJI:** Lek

**PRODUCENT:** GLAXO

**ILOŚĆ:** 10 ml

### OPIS:

Otrivin 1 mg/1 ml to aerozol do nosa w postaci roztworu dla dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

### DZIAŁANIE:

Otrivin Katar i Zatoki jest miejscowo działającym lekiem, zawierającym ksylometazolinę, która zmniejsza przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa, występujące w przebiegu przeziębienia, kataru sienneo, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia zatok. Mentol i eukaliptol pozostawiają wrażenie chłodu na błonach śluzowych nosa. Działanie leku Otrivin Katar i Zatoki rozpoczyna się już w ciągu 2 minut i utrzymuje do 12 godzin.

### WSKAZANIA:

Nadmierne przekrwienie błony śluzowej nosa, występujące w przebiegu przeziębienia, kataru siennego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia zatok. Produkt leczniczy ułatwia odpływ wydzieliny z zapalnie zmienionych zatok przynosowych. Dzięki zmniejszeniu przekrwienia błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej może być stosowany wspomagająco w zapaleniu ucha środkowego. Produkt ułatwia wziernikowanie nosa.

#### DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Podanie donosowe. Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 dawka aerozolu Otrivin do każdego otworu nosowego 3 razy na dobę. Nie należy stosować więcej niż 3 razy na dobę do każdego otworu nosowego.

#### SKŁAD:

1 ml roztworu zawiera ksylometazoliny chlorowodoru oraz: sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, sodu chlorek, disodu edetynian, lewomentol, cyneol (eukaliptol), sorbitol, makrogollicerolu hydroksystearynian, wodę oczyszczoną.

#### OSTRZEŻENIA:

Nie stosować leku Otrivin, jeśli pacjent ma uczulenie na ksylometazoliny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, jeśli pacjent przebył operację wykonywaną przez nos, np. usunięcie przysadki lub operację przebiegającą z odsłonięciem opony twardej (operacja mózgu wykonywana przez nos lub usta), jaskra z wąskim kątem przesączania (podwyższone ciśnienie w oku), przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku: podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi, choroby serca, nadczynności tarczycy, cukrzycy, wzrostu gruczołu krokowego, łagodnego nowotworu nadnercza, który wytwarza duże ilości adrenaliny i noradrenaliny (guz chromochłonny), przyjmowania niektórych leków przeciwdepresyjnych znanych jako inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) lub w przypadku przyjmowania ich w ciągu ostatnich 2 tygodni, podobnie jak inne leki obkurczające błonę śluzową nosa, może powodować bezsenność, zawroty głowy, drżenie, zaburzenia rytmu serca i podwyższone ciśnienie tętnicze, nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat, nie należy stosować leku w czasie ciąży.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Jeśli pacjentka Jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

**Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.**