

Otrivin Regeneracja aer.d/nosa 10ml



Cena: 30,61 PLN

Opis słownikowy

Dawka	(1mg+0,05g)/ml
Opakowanie	10 ml
Postać	aer.do nosa, roztwór
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Xylometazolini hydrochloridum, Dexpanthenolum

Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: GLAXOSMITHKLINE

ILOŚĆ: 10 ml

OPIS:

Otrivin Regeneracja to lek w postaci aerozolu do nosa.

DZIAŁANIE:

Lek Otrivin Regeneracja zawiera substancję czynną ksylometazolini chlorowodorek, która ma działanie obkurczające naczynia krwionośne i zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa. Lek zawiera także substancję czynną deksopantenol, który jest pochodną witaminy – kwasu pantotenowego. Wspomaga on gojenie się ran i chroni błonę śluzową nosa.

WSKAZANIA:

Przeznaczony do stosowania u osób dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat: w celu zmniejszenia obrzęku błony śluzowej nosa w

zapaleniu błony śluzowej nosa, a także jako leczenie wspomagające gojenie ran skóry i błony śluzowej, w łagodzeniu naczynioruchowego zapalenia błony śluzowej nosa i leczeniu utrudnionego oddychania przez nos po przebytej operacji nosa, w celu zmniejszenia obrzęku błony śluzowej nosa w zapaleniu błony śluzowej nosa związanym z ostrym zapaleniem zatok przynosowych (zapalenie błony śluzowej nosa i zatok).

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego 3 razy na dobę. Nie należy stosować więcej niż 3 razy na dobę do każdego otworu nosowego. Stosowanie leku przez długi okres czasu może skutkować nasileniem objawów blokady nosa. Nie stosować dłużej niż przez 5-7 dni.

SKŁAD:

1 ml roztworu zawiera: substancję czynną: ksylometazoliny chlorowodorek 0,1 mg, deksopantenol 5 mg oraz substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek (roztwór), potasu diwodorofosforan, disodu fosforan dwunastowodny, woda oczyszczona.

OSTRZEŻENIA:

Nie stosować leku w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników leku, po przebyciu operacji wykonywanej przez nos, jaskra, podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, choroby serca, nadczynność tarczycy, cukrzyca, nie podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat, ciąża, laktacja.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.