

## Oxalin Baby żeldonosa 0,25mg/g 10g(but.)



Cena: 23,74 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	0,25 mg/g
Opakowanie	10 g (but.)
Postać	żel do nosa
Producent	WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
Rejestracja	
Substancja czynna	Oxymetazolini hydrochloridum

### Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: lek  
 PRODUCENT: Warszawa POLFA  
 ILOŚĆ: 10 g

Oxalin Baby żeldonosa 0,25mg/g 10g(but.)

#### DZIAŁANIE:

Oxalin Baby zwęża naczynia krwionośne, zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa i hamuje nadmierne wydzielanie, co ułatwia swobodne oddychanie przez nos. Udrażnia przewody nosowe i ułatwia odpływ wydzieliny z zatok przynosowych.

#### WSKAZANIA:

Obrzęk błon śluzowych występujący w: ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa; naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej nosa; alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa; zapaleniu zatok przynosowych; zapaleniu trąbki słuchowej; zapaleniu ucha środkowego.

#### DAWKOWANIE:

Dzieci w wieku powyżej 1 roku życia do 6 lat:  
 1 dawka do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy na dobę.

#### SKŁAD:

1g żelu zawiera 0,25mg oksymetazolinyl chlorowodoru oraz substancje pomocnicze: sodu chlorek, disodu fosforan dwunasto wodny, sodu diwodoru fosforan jednowodny, disodu edetynian, hydroksyetylocelulozę, glicerol, benzalkoniowy chlorek roztwór, woda oczyszczona.

**OSTRZEŻENIA:**

Preparaty zawierające oksymetazolinę mogą być stosowane ze szczególną ostrożnością i tylko po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści i ryzyka w przypadku: - leczenia inhibitorami monoaminoooksydazy ( IMAO ) i innymi lekami zwiększającymi ciśnienie tętnicze; - zwiększonego ciśnienia śródgałkowego, szczególnie w przypadku jaskry z zamkniętym kątem; - ciężkich chorób serca i naczyń krwionośnych, np. choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego; - guza chromochlonnego nadnerczy; - zaburzeń metabolicznych, np. nadczynności tarczycy, cukrzycy. Długotrwałe stosowanie oraz nadużywanie leków zmniejszających obrzęk błony śluzowej nosa mogą prowadzić do osłabienia ich działania. Mogą również spowodować uszkodzenie komórek nabłonka błony śluzowej nosa, zahamowanie aktywności rzęsek i doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia błony śluzowej nosa oraz suchego zapalenia błony śluzowej nosa. Należy unikać stosowania dłuższego niż zalecane oraz przedawkowania. Ze względu na zawartość chlorku benzalkoniowego , preparat może powodować podrażnienie błony śluzowej nosa.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.