

# Paracetamol Hasco sm.pomar.120mg/5ml150ml



Cena: 15,97 PLN

## Opis słownikowy

Dawka	0,12 g/5ml
Opakowanie	150 g (butelka)
Postać	zaw.doust.
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Rejestracja	
Substancja czynna	Paracetamolum

## Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: lek  
PRODUCENT: HASCO - LEK  
ILOŚĆ: 150 ML

PARACETAMOL HASCO, zawiesina (o smaku pomarańczowym) 120 mg / 5 ml

### DZIAŁANIE:

Lek Paracetamol Hasco, zawiesina doustna jest lekiem przeciwgorączkowym i przeciwbólowym przeznaczonym do stosowania u niemowląt i dzieci. Stosowany w zalecanych dawkach jest dobrze tolerowany. Wskazaniami do stosowania leku są gorączka i bóle różnego pochodzenia (np. po zabiegach chirurgicznych, bóle związane z wyrzynaniem się zębów, bóle głowy o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu) oraz dolegliwości towarzyszące reakcji organizmu na szczepionkę (ból, gorączka, odczyn miejscowy). Ponadto lek stosuje się u niemowląt od 0 do 3 miesiąca życia do leczenia objawowego gorączki trwającej nie dłużej niż 3 dni oraz bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego.

### WSKAZANIA:

Gorączka i bóle różnego pochodzenia (np. po zabiegach chirurgicznych, bóle związane z wyrzynaniem się zębów, bóle głowy o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu), dolegliwości towarzyszące reakcji organizmu na szczepionkę (ból, gorączka, odczyn miejscowy).

U niemowląt od 0 do 3 miesiąca życia (o masie ciała do 4 kg): leczenie objawowe gorączki trwającej nie dłużej niż 3 dni oraz bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego.

### DAWKOWANIE:

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie

wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek stosuje się doustnie. Przed użyciem energicznie wstrząsnąć w celu uzyskania jednolitej zawiesiny. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, przeciętna jednorazowa dawka paracetamolu wynosi 10 do 15mg na kilogram masy ciała. W razie konieczności dawkę można powtarzać, nie częściej niż co 4-6 godzin, do 4 razy na dobę, czyli maksymalnie 60 mg/kg mc./dobę.

W tabeli poniżej podano przykładowy schemat obliczania dawki leku: Wiek (masa ciała dziecka) Zalecana Dawka Jednorazowa Maksymalna Dawka Dobowa

od 0 do 3 miesiąca życia (do 4 kg)	2,5 ml(60 mg)	10 ml(240 mg)
od 4 do 8 miesiąca życia (do 7 kg)	4 ml(96 mg)	16 ml(384 mg)
od 9 do 11 miesiąca życia (do 8 kg)	5 ml(120 mg)	20 ml(480 mg)
od 1 do 2 lat (do 10,5 kg)	6,5 ml (156 mg)	26 ml (624 mg)
od 2 do 3 lat (do 13 kg)	8 ml(192 mg)	32 ml(768 mg)
od 4 do 5 lat (do 18,5 kg)	12 ml(288 mg)	48 ml(1152 mg)
od 6 do 8 lat (do 24 kg)	15 ml(360 mg)	60 ml(1440 mg)
od 9 do 10 lat (do 32 kg)	20 ml(480 mg)	80 ml(1920 mg)
od 11 do 12 lat (do 45,6 kg)	28,5 ml(684 mg)	114 ml(2736 mg)

Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 3 dni. Stosowanie u dzieci poniżej 2 lat powinno być zlecone przez lekarza. Do opakowania dołączona jest miarka lub łyżka miarowa lub korek i strzykawka doustna. Instrukcja dawkowania przy pomocy strzykawki doustnej: po odkręceniu zakrętki nałożyć strzykawkę na korek umieszczony w szyjce butelki, aby napełnić strzykawkę, butelkę należy energicznie wstrząsnąć, odwrócić do góry dnem, a następnie ostrożnie przesunąć tłok strzykawki do dołu, wciągając zawiesinę w pożądanej ilości określonej na podziałce, butelkę odwrócić do pozycji początkowej i ostrożnie wyjąć strzykawkę z korka, końcówkę strzykawki należy umieścić w ustach dziecka, a następnie wolno wciskając tłok, ostrożnie opróżnić zawartość strzykawki, po zastosowaniu butelkę zamknąć, a strzykawkę umyć i wysuszyć. 4/5 Brak specjalnych zaleceń dotyczących stosowania z posiłkiem. W przypadku wrażenia, że działanie leku Paracetamol Hasco jest za mocne lub za słabe, należy

#### SKŁAD:

5 ml zawiesiny zawiera 120 mg paracetamolu (paracetamolum).

#### OSTRZEŻENIA:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu leczniczego, ciężka niewydolność wątroby lub wirusowe zapalenie wątroby, ciężka niewydolność nerek, choroba alkoholowa.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.