Pelavo Oskrzela kaszel mokry i suchy 120 ml

Cena: 42,53 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	120 ml
Postać	-
Producent	USP ZDROWIE SP. Z O.O
Rejestracja	
Substancja czynna	-

Opis produktu

Pelavo Kaszel suchy i mokry

Pelavo Kaszel suchy i mokry w postaci syropu chroni błonę śluzową. Łagodzi kaszel suchy i mokry.
Pelavo Kaszel suchy i mokry pomaga w łagodzeniu kaszlu i uczuciu pieczenia, a także ułatwia usuwanie nadmiaru wydzieliny dzięki wyjątkowej kompozycji polisacharydów zawartych w wyciągach roślinnych oraz w kompleksie MUCOBARRYL® PLUS.

Pelavo Kaszel suchy i mokry zawiera wyciągi roślinne, które pomagają chronić błonę śluzową, łagodzić kaszel i ułatwiają odkrztuszanie. Polisacharydy zawarte w wyciągach roślinnych i w kompleksie MUCOBARRYL® PLUS tworzą żel przylegający do błony śluzowej, który zapewnia działanie ochronne i stanowi barierę ograniczającą kontakt z czynnikami i substancjami drażniącymi pochodzenia zewnętrznego. Ze względu na powinowactwo do wody, polisacharydy sprzyjają nawilżeniu błon śluzowych i rozrzedzają śluz. Ponadto wyciągi roślinne łagodzą zarówno kaszel suchy, jak i mokry.
Dzięki zawartości miodu produkt charakteryzuje się przyjemnym smakiem.

Skład:

Kompleks MUCOBARRYL® PLUS, syrop fruktozowy, miód, koncentrat soku jabłkowego, wyciąg z babki lancetowatej, wyciąg z prawoślazu, aromat pomarańczowy, olejek eteryczny ze słodkiej pomarańczy, karmel.

Sposób użycia:

Podanie doustne.
Dzieci w wieku od 1 do 6 lat: pół miarki (5 ml) 2 razy na dobę
Dzieci w wieku od 7 do 12 lat: pół miarki (5 ml) do 4 razy na dobę
Dorośli: 1 miarka (10 ml) 2-4 razy na dobę.

Przed użyciem produkt należy energicznie wstrząsnąć.
Po użyciu należy dokładnie zakręcić butelkę.

Działania niepożądane
Nie zgłoszono działań niepożądanych wyrobu medycznego stosowanego w zalecanych dawkach, za wyjątkiem rzadkich przypadków łagodnego i przejściowego wzdęcia wywołanego fermentacją polisacharydów w przewodzie pokarmowym.
Nie należy stosować wyrobu medycznego w przypadku występowania alergii/nadwrażliwości na zawarte w nim substancje.
Nie należy stosować wyrobu medycznego w przypadku występowania alergii na pszczoły.

Interakcje z suplementami diety i lekami
Jedyna zaobserwowana interakcja pomiędzy składnikami wyrobu medycznego Pelavo Kaszel suchy i mokry, w zalecanych dawkach, a lekami polegała na modyfikacji farmakokinetyki ibuprofenu przez arabinogalaktan z drzewa modrzewiowego.
Dlatego zaleca się stosowanie produktu dwie godziny przed przyjęciem bądź po przyjęciu leków lub suplementów diety.
W przypadku równoczesnego stosowania z lekami wskazane jest zasięgnięcie opinii lekarza.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując wyrób medyczny Pelavo Kaszel suchy i mokry
Wyrób medyczny zawiera glukozę i fruktozę. Ma to znaczenie w przypadku pacjentów, którzy kontrolują spożycie cukrów. U dzieci poniżej 12 lat stosować po konsultacji z lekarzem.
Nie należy stosować wyrobu medycznego u osób z ograniczoną drożnością przełyku. W przypadku przepukliny rozworu przełykowego, przed zastosowaniem produktu należy zasięgnąć porady lekarza.
Wyrób medyczny należy zużyć w ciągu 2 miesięcy po otwarciu.

Należy przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci.

W przypadku występowania nietolerancji na wyrób medyczny nie należy go stosować.
Osoby ze stwierdzoną nadwrażliwością na składniki produktu nie powinny go stosować: wyrób medyczny zawiera porost islandzki oraz arabinogalaktan z drzewa modrzewiowego.
Nie należy stosować produktu przez okres dłuższy niż 30 dni. Jeśli po tym czasie objawy będą się utrzymywać, należy zasięgnąć opinii lekarza. Nie należy stosować dawki większej niż zalecana.