

Plast. COMPEED na pęcherze wąski 6szt



Cena: 27,44 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	6 szt.
Postać	-
Producent	JOHNSON & JOHNSON POLAND SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: wyrób medyczny
 PRODUCENT: Johnson & Johnson Poland Sp z o.o
 ILOŚĆ: 6 sztuk

COMPEED® Plastry na pęcherze, wąskie

DZIAŁANIE:

Technologia hydrokoloidu COMPEED® to aktywny żel zawierający cząsteczki absorbujące wilgoć. Plaster COMPEED® działa jak druga skóra, pomaga utrzymać naturalne nawilżenie skóry, aby:
 przynosić natychmiastową ulgę w bólu i ucisku spowodowanym przez pęcherze,
 ochraniać przed otarciami,
 zapewniać szybkie gojenie się ran.
 Pozostaje na miejscu przez kilka dni. W indywidualnych przypadkach czas ten może się różnić.

WSKAZANIA:

Plastry na zrogowacenia na stopach

DAWKOWANIE:

Umyj oraz osusz skórę przed zastosowaniem. Upewnij się, czy skóra dotknięta pęcherzem nie jest tłusta od kremu bądź oliwki. Usuń dolną warstwę papierową, starając się unikać dotykania warstwy samoprzylepnej. Nałóż plaster mocno na pęcherz, upewniając się, czy brzegi plastra są dobrze dociśnięte do skóry. Pozostaw plaster na pęcherzu aż do momentu, kiedy sam zacznie się odklejać (uwaga: może pozostawać na miejscu nawet do kilku dni). Aby usunąć plaster, nie pociągaj do góry, tylko powoli rozciągnij wzdłuż skóry.

SKŁAD:

Hydrokoloid

OSTRZEŻENIA:

Nie powinno się celowo przekłuwać pęcherzy, ponieważ goją się one lepiej pod warstwą zapewniającego ochronę naskórka.

Nigdy nie przecinaj plastrów COMPEED®.

Nie należy stosować na zainfekowane rany.

Nie wolno stosować ponownie tego samego plastra (mogłoby to spowodować infekcję).

W przypadku gdy rana pęcherza pogarsza się, przerwij leczenie i skonsultuj się z lekarzem.

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej natychmiast skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu.

Osoby chore na cukrzycę przed użyciem powinny zasięgnąć porady lekarza.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.