Plast.SUTRICON silik. n/blizny 5x30cm.

Cena: 136,49 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 op. (5 szt.)
Postać	-
Producent	VERCO
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny

PRODUCENT: Verco S.A.

ul. Jacka Odrowąża 15,

03-310 Warszawa

ILOŚĆ: 1 op (5 plastrów)

Plastry silikonowe SUTRICON . na blizny

DZIAŁANIE:

Silikonowe plastry skutecznie poprawiają wygląd i elastyczność blizn. Ich innowacyjna struktura, zawierająca żel silikonowy, posiada właściwości zbliżone do zdrowej ludzkiej skóry: elastyczność, przepuszczalność tlenu i zapobieganie procesowi nadmiernej transepidermalnej utracie wody. Dzięki tym cechom plastry redukują dyskomfort związany z blizną, taki jak ból, swędzenie czy uczucie ciągnięcia

WSKAZANIA:

Plastry silikonowe Sutricon przeznaczone są do:

blizn pooperacyjnych

blizn poparzeniowych

blizn po cesarskim cięciu

blizn pourazowych

w zapobieganiu nieprawidłowemu bliznowaceniu

dla dzieci (już od 6. miesiąca życia) i dorosłych

w zmniejszeniu widoczności blizn świeżych i dojrzałych (nawet do 10 lat)

DAWKOWANIE:

Silikonowe plastry Sutricon można stosować po całkowitym zagojeniu rany i po zdjęciu szwów. Przed użyciem należy dokładnie oczyścić i osuszyć bliznę. W celu dopasowania wielkości plastra do powierzchni blizny, możliwe jest jego docięcie w dowolny sposób. Plaster należy zmieniać średnio co 3 do 5 dni, jednak najlepsze efekty uzyskuje się wymieniając plaster co 24 godziny.

Aby osiągnąć zadowalające efekty, należy stosować preparat regularnie i postępować zgodnie z instrukcją używania. Długość terapii jest indywidualna i zależy od wielu czynników m. in. wielkości i rodzaju blizny, wieku czy uwarunkowań genetycznych. Pierwsze efekty stosowania plastrów mogą być widoczne już po miesiącu, jednak pełna kuracja powinna trwać:

min. 3 miesiące w przypadku blizn świeżych

min. 6 miesięcy w przypadku blizn starszych

Przy skłonnościach do nieprawidłowego bliznowacenia, np. keloidów czy bliznowców zaleca się stosowanie plastrów Sutricon przez cały okres przebudowy blizny, nawet do 1 roku.

SKŁAD:

1 opakowanie zawiera 5 plastrów w rozmiarze 5 x 30 cm

Żel silikonowy, elastyczna membrana poliuretanowa.

OSTRZEŻENIA:

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.