

## Płyn Lugola 20g COEL



Cena: 17,71 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	(0,01g+0,02g)/g
Opakowanie	20 g
Postać	płyn
Producent	WYTWÓRNIA EUCERYNY LABORAT.FARMAC.COEL SPÓŁKA JAWNA E.Z.M.
Rejestracja	
Substancja czynna	Iodum, Kalii jodidum

### Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: Lek  
 PRODUCENT: WYTWÓRNIA EUCERYNY  
 LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE "COEL"  
 ILOŚĆ: 20 g

SOLUTIO IODI CUM GLYCERINI COEL

DZIAŁANIE:

Odkazające

WSKAZANIA:

Roztwór do stosowania miejscowego na skórę, do odkażania skóry nieuszkodzonej, otarć naskórka, drobnych zadrapań oraz brzegów ran.

DAWKOWANIE:

W celu odkażenia skóry nieuszkodzonej stosować roztwór nie rozcieńczony. Zmienione chorobowo miejsce należy pędzlować lub przemyć sterylnym gazikiem nasączonym roztworem.

SKŁAD:

1 g płynu zawiera:  
 substancje czynne: jod 10 mg, jodek potasu 20 mg  
 substancje pomocnicze: gliceryna 99,5%, woda oczyszczona

**OSTRZEŻENIA:**

Interakcje: Długotrwałe stosowanie preparatu z jodem może zaburzać badania czynnościowe tarczycy. Niedobór jodu nasila, a nadmiar jodu osłabia wrażliwość na leczenie nadczynności tarczycy tyreostatykami. Należy zatem odstawić preparat jodowy przed i w czasie leczenia nadczynności tarczycy. Bezwzględnie preparatu z jodem nie należy stosować ze związkami rtęci.

Działania niepożądane: U osób nadwrażliwych na jod może wystąpić podrażnienie błony śluzowej jamy nosowo – gardłowej, zapalenie skóry z pojawieniem się pęcherzyków, świądem, wrzodziejącymi nadżerkami. Czasami mogą wystąpić objawy ogólne z gorączką, wysypką, obrzmieniem węzłów chłonnych, a nawet wstrząsem groźnym dla życia. Przewlekłe stosowanie preparatów z jodem może wywołać nadczynność tarczycy, trądzik jodowy oporny na leczenie, alergię miejscową lub uogólnioną. Stosowanie dużych dawek jodu u chorych na wole endemiczne może prowadzić do tyreotoksykozy.

Stosowanie w ciąży i podczas karmienia piersią: Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem. Brak danych na temat stosowania preparatu u kobiet w ciąży i w okresie laktacji. Należy unikać niekontrolowanego stosowania związków jodu przez kobiety ciężarne i karmiące piersią, w tym także preparatów stosowanych miejscowo na skórę i błony śluzowe.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem: Długotrwałe stosowanie preparatu lub stosowanie na duże powierzchnie skóry może być przyczyną nadczynności tarczycy u pacjentów z utajonymi zaburzeniami czynności tarczycy (zwłaszcza u pacjentów w wieku starszym).

Podany doustnie hamuje czynność tarczycy.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.