

Raniseptol blizny żel 20 ml

Cena: 18,21 PLN



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	20 ml
Postać	żel
Producent	N.P.ZDROVIT SP Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

Opis produktu

Raniseptol blizny żel 20 ml

ZASTOSOWANIE:

Raniseptol to silikonowy żel na blizny przeznaczony do stosowania miejscowego w celu wspomagania leczenia blizn różnego pochodzenia. Stosowany systematycznie wspomaga leczenie blizn przerostowych i bliznowców (keloidów), pomaga zapobiegać nieprawidłowemu bliznowaceniu ran zamkniętych oraz łagodzi objawy związane z bliznami, jak uczucie napięcia czy swędzenie. Poprawia wygląd blizny, zmniejsza ją i rozjaśnia. Łagodzi świąd, znosi uczucie napięcia i tym samym poprawia jakość życia pacjenta. Regularne stosowanie żelu poprawia wygląd blizn zarówno świeżych jak i starych.

Raniseptol blizny zalecany jest wspomagająco w leczeniu:

- blizn po zabiegach chirurgicznych i operacjach (w tym blizny po cesarskim cięciu),
- blizn po operacjach plastycznych i zabiegach laserowych,
- blizn po oparzeniach,
- blizn potrądzikowych,
- blizn pourazowych,
- blizn przerostowych,
- bliznowców (keloidów),
- rozstępów.

Preparat może być stosowany pod makijaż.

ZALECANA SPOSÓB UŻYCIA:

Stosowanie preparatu powinno rozpocząć się po całkowitym zagojeniu rany i po zdjęciu ewentualnych szwów.

Na dokładnie umytą i osuszoną powierzchnię blizny nanieść niewielką ilość żelu i masować ją kolistymi ruchami przez około 2-3 minuty.

Należy rozcierać bliznę lekko uciskając ją opuszkami palców. Pozostawić do wyschnięcia przed nałożeniem okrycia wierzchniego. Zaleca się stosowanie żelu minimum 2 razy dziennie.

SKŁAD:

Mieszanka polisiloksanów, dwutlenek krzemu.

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.