

# Scorbolamid 300mg+5mg+100mg 20 tabl

Cena: 14,08 PLN



## Opis słownikowy

Dawka	0,3g+0,005g+0,1g
Opakowanie	20 tabl.
Postać	tabl.drażow.
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	
Substancja czynna	Salicylamidum, Rutosidum, Acidum ascorbi

## Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: lek

PRODUCENT:

ILOŚĆ: 20 tabletek

Scorbolamid (100mg + 5mg + 300mg) x 20 tabl. draż.

### DZIAŁANIE:

Lek Scorbolamid zawiera:Salicylamid- działaprzeciwgorączkowo, przeciwbólowo i przeciwzapalnie.Rutozyd-wzmacnia naczynia krwionośne i zwiększa ich elastyczność. Ponadto chroni witaminę C przed utlenieniem i dlatego witamina C dłużej działa.Kwas askorbowy (witamina C) -uzupełnia niedobór witaminy C, wspomagającej odporność organizmu w czasie zakażeń.

### WSKAZANIA:

Gorączka i ból związane z przeziębieniem lub grypą, bóle głowy, nerwobóle.

### DAWKOWANIE:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano wulotce dla pacjenta lub według zaleceńlekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Dorośli i młodzież w wieku powyżej 16 lat:Doustnie, zwykle 1do 2 tabletek drażowanych3 razy na dobę.Leknajlepiej przyjmować w czasie posiłku,albo popić szklanką wody lub mleka.Należy stosować najmniejsze skuteczne dawki. Leczenie objawowe bez porady lekarskiej należy prowadzić najkrócej jak to możliwe.

### SKŁAD:

Substancjami czynnymi leku są salicylamid, kwas askorbowyi rutozyd. Każda tabletkadrażowana zawiera 300 mg salicylamidu, 100 mg kwasu askorbowego oraz 5 mg rutozydu. -Pozostałe składniki to:skrobia ziemniaczana, żelatyna, talk, woda oczyszczona (stanowiące rdzeń tabletki drażowanej) oraz sacharoza, talk, guma arabska, żółcień chinolinowa (E104), wosk Carnauba i woda oczyszczona

(stanowiące otoczkę).

#### OSTRZEŻENIA:

Kiedy nie stosować leku Scorbolamid- jeśli pacjent ma uczulenie na salicylamid, niesteroidowe leki przeciwzapalne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;-jeśli pacjent ma astmę z polipami nosa;-jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka i(lub) dwunastnicy i(lub) stany zapalne przewodu pokarmowego;-jeśli pacjent ma zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (cukrzyca, mocznica, tężyczka);-jeśli pacjent ma zaburzenia krzepliwości krwi (np. hemofilia, trombocytopenia);-jeśli pacjent magenetycznie uwarunkowany niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej; -jeśli pacjent makamicę nerkową;-jeśli pacjent ma hemochromatozę (cukrzyca brązowa), niedokrwistość syderoblastyczną, nadmierną ilość kwasu moczowego we krwi lub szczawianów w moczu; -jeśli pacjentka jest w ciąży;-jeśli pacjentka karmi piersią;-u dzieci w wieku poniżej 16 lat, (poza rzadkimi chorobami, takimi jak np. choroba Kawasaki),

Zze względu na możliwość wystąpienia zespołu Reye'a, rzadkiej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu).

Ostrzeżenia i środki ostrożności Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Scorbolamid:-jeśli pacjent ma astmę oskrzelową;-jeśli pacjent ma niewydolność wątroby lub nerek;-u pacjentów po przebytej chorobie wrzodowej i krwawieniach z przewodu pokarmowego.Scorbolamid a inne leki Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.Należy zachować ostrożność stosując lek Scorbolamid z:-lekami zawierającymi kwas acetylosalicylowy, ani innymi lekami z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. ibuprofen, diklofenak);-kortykosteroidami (silne leki przeciwzapalne) salicylamid może nasilać objawy niepożądane ze strony przewodu pokarmowego;-doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi, lekami przeciwzakrzepowymi, metotreksatem(lek stosowany w chorobach nowotworowych), kwasem walproinowym(lek stosowany w leczeniu padaczki), sulfonamidami(leki przeciwbakteryjne), lekami stosowanymi w dnie moczanowej, przed zastosowaniem leku należy zasięgnąć opinii lekarza; -kwasem askorbowym, który może zmniejszać skuteczność warfaryny (lek przeciwzakrzepowy) oraz stężenie flufenazyny(lek stosowany w leczeniu schizofrenii)w osoczu.Scorbolamid z jedzeniem, pić i alkoholem Lek najlepiej przyjmować w czasie posiłku, albo z dużą ilością wody lub mleka.Alkohol może nasilać działania niepożądane.Ciąża i karmienie piersią Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.Lek jest przeciwwskazany u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Brak informacji dotyczących przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn w czasie stosowania leku Scorbolamid.Lek Scorbolamid zawiera sacharozę i żółcień chinolinową (E104).Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.Lek może powodować reakcje alergiczne.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.