

Silcontrol 25 mg 8 tabletek



Cena: 21,10 PLN

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|--------------|
| Dawka | 25 mg |
| Opakowanie | 8 tabl. |
| Postać | tabl.powl. |
| Producent | ZENTIVA K.S. |
| Rejestracja | |
| Substancja czynna | Sildenafilum |

Opis produktu

Silcontrol

to lek stosowany w leczeniu zaburzeń wzrodu u dorosłych mężczyzn.

DZIAŁANIE:

Lek Silcontrol zawiera substancję czynną – sylденаfil, który należy do leków z grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5. Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego.

WSKAZANIA:

W leczeniu zaburzeń wzrodu u dorosłych mężczyzn.

DAWKOWANIE:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Zalecana dawka leku Silcontrol to 25 mg. Lekarz po konsultacji może zalecić inny sposób dawkowania.

Silncontrol należy przyjąć na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną.

Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody.

Silcontrol umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod wpływem pobudzenia seksualnego.

Obfity posiłek może opóźnić działanie leku.

Erekcja po zażyciu Silcontrolu pojawia się w różnym czasie u różnych pacjentów, zwykle występuje od pół godziny do jednej godziny.

SKŁAD:

Substancją czynną leku jest syldenafil (Sildenafilum).

Jedna tabletkę leku zawiera 25 mg syldenafilu (w postaci cytrynianu).

Oraz substancje pomocnicze

OSTRZEŻENIA:

Przed zastosowaniem leku należy się zapoznać z narzędziem diagnostycznym (ankietą).

Leku Silcontrol nie należy stosować częściej niż raz na dobę.

W przypadku występowania dolegliwości sercowych należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku.

W przypadku nieprawidłowości w budowie prącia należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Jeśli w czasie stosunku płciowego lub po nim wystąpią bóle w klatce piersiowej:

- należy przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić,
- nie przyjmować azotanów, w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej,
- zasięgnąć pomocy medycznej.

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub długich bolesnych wzdwoń (ponad 4h) należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.